

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「待克派滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
待克派滅芬	difenoconazole + pydiflumetofen	(1) 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether (2) 3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[(RS)-1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide

二、「待克派滅芬」農藥使用方法與範圍一覽表

200 g/L(20% w/v) 待克派滅芬 水懸劑(SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
西瓜 香瓜 洋香瓜	蔓枯病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7	最多 4 次		3	使用本藥劑後不可與非本藥劑核准使用範圍輪作，以免蓄積殘留。	原始登 記廠商 名稱：台 灣先正 達股份 有限公 司