

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「聚乙醛」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

20(%) (w/w) 聚乙醛 水分散性油懸劑 (OD)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
紅龍果	扁蝸牛	3.75-5公升	400	田間出現扁蝸牛時開始施藥，全株噴施。	7	共4次		3		
紅龍果	扁蝸牛	3.75-5公升	400	田間出現扁蝸牛時開始施藥，全株噴施。	7	共4次		3		

3.25(%) (w/w) 聚乙醛 餌劑 (RB)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	福壽螺	9 公斤		插秧前 1-3 天或當天。					施藥時田水保持 1-3 公分，約 7 天。施藥當天不排水，以免危害其他水生生物。	
作物園	非洲蝸牛	1 公克/平方公尺								
作物園	蛞蝓	1 公克/平方公尺								
造林地	非洲蝸牛	8.4 公斤		萌芽後。						

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

6(%) (w/w) 聚乙醛 餌劑 (RB)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	福壽螺	5 公斤		插秧前 1-3 天或當天。					施藥時田水保持 1-3 公分，約 7 天。施藥當天不排水，以免危害其他水生物。	
作物園	非洲蝸牛	0.54 公克/平方公尺								
作物園	蛞蝓	0.54 公克/平方公尺								
造林地	非洲蝸牛	4.55 公斤		萌芽後。						

80(%) (w/w) 聚乙醛 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	福壽螺	1.2 公斤		插秧前。						重複範圍，本項刪除。
水稻	福壽螺	1.2 公斤		插秧前施藥。						
文心蘭	扁蝸牛	1.25 公 斤	800	扁蝸牛發 生時施藥 1 次。					建議於傍晚 施藥。	本項新增。原始登記廠商名稱：漢寶工業有限公司。