※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「液化澱粉芽孢桿菌 PMB01」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 液劑 (AL) 1x10^9 CFU/mL

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蔬菜	萎凋病	4-36 公升(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期於每株莖基部或根圈灌注200毫升稀釋液。	7	共5次				
茄科小葉菜類	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	共5次				
蘿蔔	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	最多5次				
茄科根菜類	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	共5次				
茄科果菜類	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	共5次				
胡瓜	萎凋病		200	病害發生初期於每株莖基部或根圈灌注200毫升稀釋液。	7	共5次				
絲瓜	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	最多5次				
瓜果類	青枯病	0.2 公升/株(稀釋	200	病害發生初期開始施藥。	7	最多5次				

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		後藥液量)								
西瓜	蔓割病		200	病害發生初期於每株莖基部或根圈灌注200毫升稀釋液。	7	共5次				
花木	萎凋病	4-36公升(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期於每株莖基部或根圈灌注200毫升稀釋液。	7	共5次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可溼性粉劑 (WP) 1x10^9 CFU/g

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蔬菜	萎凋病	4-36 公升(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期於每株莖基部或根圈灌注 200 毫升稀釋液。	7	共 5 次				
十字花科乾豆類	黑腐病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	共 5 次				
十字花科包葉菜類	黑腐病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	共 5 次				
十字花科小葉菜類	黑腐病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	共 5 次				
茄科小葉菜類	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	共 5 次				
十字花科根菜類	黑腐病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	共 5 次				
蘿蔔	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	最多 5 次				
茄科根菜類	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	共 5 次				
茄科果菜類	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	共 5 次				
絲瓜	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液	200	病害發生初期開始施藥。	7	最多 5 次				

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		量)								
瓜果類	青枯病	0.2 公升/株(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期開始施藥。	7	最多5次				
花木	萎凋病	4-36 公升(稀釋後藥液量)	200	病害發生初期於每株莖基部或根圈灌注 200 毫升稀釋液。	7	共 5 次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
不結球萵苣與半結球萵苣	細菌性斑點病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	共 5 次				本項新增。
十字花科小葉菜類										
十字花科包葉菜類										
十字花科根菜類										
十字花科乾豆類										
茄科果菜類										
芫荽	細菌性葉枯病									