

一、平硫瑞

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
平硫瑞	penthiopyrad	(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide

20.000%平硫瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	原始登記廠商名稱
草莓	灰黴病	0.5 公升	2000	病害發生時開始施藥	7	連續 2 次		1		原始登記廠商名稱：惠光股份有限公司

二、液化澱粉芽孢桿菌 QST713

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
液化澱粉芽孢桿菌 QST713	Bacillus amyloliquefaciens QST713	Bacillus amyloliquefaciens QST713

1x10⁹ CFU/G 以上液化澱粉芽孢桿菌 QST713 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	原始登記廠商名稱
不結球萵苣與半結球萵苣	露菌病	3 公升	400	4 片本葉前開始施藥	7	連續 3 次				原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司
結球萵苣	露菌病	3 公升	400	4 片本葉前開始施藥	7	連續 3 次				原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司

三、氟殺待克利

新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC
氟殺待克利	fluxapyroxad+ difenoconazole	(1)3-(difluoromethyl)-1-methyl-2'-(3,4,5-trifluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxanilide (2)3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

125 G/L(12.5% W/V) 氟殺待克利 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期	注意事 項	原始登記廠商名稱
胡瓜	白粉病	1 公升	900	病害發生初期開 始施藥	7	連續 3 次		5		原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有 限公司