

「派滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

200 g/L(20% w/v) 派滅芬 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	黑斑病	0.17-0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 2 次		10	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	本項修正。
結球萵苣	黑斑病	0.17-0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		15	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	本項修正。
番茄	早疫病	0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 2 次		3	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	本項修正。
甜椒	早疫病	0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 2 次		3	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	本項修正。
香蕉	黑星病	0.417 公升	2400	病害發生初期開始施藥。	14	共 4 次		14	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	本項修正。
印度棗	白粉病	0.25 公升	4,000	病害發生初期	10	共 2 次		14		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				開始施藥。						
茄子、 辣椒、 枸杞、 香瓜 茄、樹 番茄	早疫病	0.25公 升	4,000	病害發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2次		3	使用派滅芬之 藥劑後，避免 與非本藥劑之 核准範圍作物 輪作，以免蓄 積殘留。	本項新 增。
蘋果、 梨、桃	黑星病	0.25公 升	4,000	病害發 生初期 開始施 藥。	10	共2 次		14		本項新 增。原 始登記 廠商名 稱：台 灣先正 達股份 有限公 司。