

「滅芬座」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

400 g/L (40% w/v) 滅芬座 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	紋枯病	0.25 公升	3,200	病害發生初期開始施藥。	14	共 2 次		14		
胡瓜	白粉病	0.32 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		4		
苦瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		
絲瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		
冬瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		
南瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		
扁蒲	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		
隼人瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		
越瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		
夏南瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		
木鱨果	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
西瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		本項新增。
香瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		本項新增。
洋香瓜	白粉病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		4		本項新增。