

「芬座克敏」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
芬座克敏	mefentrifluconazole + pyraclostrobin	(1)(2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- 1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol (2)methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3- yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamate

二、「芬座克敏」農藥使用方法與範圍一覽表

400 g/L (40% w/v) 芬座克敏 水懸劑(SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
甜椒	炭疽病	0.4 公升	2,000	於果實幼果時期開始施藥。	7	連續3次		3		原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司
葡萄	晚腐病	0.6 公升	2,000	果實硬核期開始施藥，每隔7天施藥1次，連續3次至套袋前為止。				14		