

## 「三氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 27 日農授防字第 1131876004A 號公告修正

三氟派瑞 水懸劑 (SC) 500 g/L (50% w/v)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	炭疽病	0.1-0.4公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		
結球萵苣	炭疽病	0.1-0.4公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		
番茄	炭疽病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
甜椒	炭疽病	0.4公升	2,500	病害發生初期開始施藥，全株均勻噴施。	7	共 2 次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
辣椒	炭疽病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
茄子	炭疽病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
枸杞	炭疽病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
香瓜茄	炭疽病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
樹番茄	炭疽病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
瓜菜類	炭疽病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 2 次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
胡瓜	白粉病	0.1公升	9,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜果類	炭疽病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續2次		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
香蕉	炭疽病	0.09-0.3公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
木瓜	炭疽病	0.2-0.7公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
番荔枝	炭疽病	0.2-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
酪梨	炭疽病	0.3-0.7公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
紅龍果	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
百香果	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
紅毛丹	炭疽病	0.2-0.4公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
草莓	炭疽病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	2		7	避免重複使用氟派瑞單劑。	本項修正。
葡萄	晚腐病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
楊桃	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
蓮霧	炭疽病	0.3-1公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
番石榴	炭疽病	0.4-0.7公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
無花果	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			7		
龍眼	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
荔枝	炭疽病	0.2-0.4公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
檬果	炭疽病	0.3公	4,000	結果後施藥。	14			18	結果後每隔	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		升							14天施藥1次至套袋前為止。	
蘋果	炭疽病	0.1-0.8公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	14	最多4次		14		
桃	炭疽病	0.1-0.8公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	14	最多4次		14		
梅	炭疽病	0.1-0.8公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	14	最多4次		14		
印度棗	炭疽病	0.3-0.4公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	14	最多4次		14		
柿	炭疽病	0.3-0.5公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
椰子	炭疽病	0.2-0.7公升	4,000	謝花幼果期施藥。	14			18		
山茶科茶類	赤葉枯病	0.3-1公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	14			14		
十字花科小葉菜類	炭疽病	0.1-0.4公升	2,500	本葉期開始施藥。	7	共2次		10		本項新增。
不結球莴苣與半結球莴苣	炭疽病	0.1-0.4公升	2,500	本葉期開始施藥。	7	共2次		10		本項新增。
茼蒿	炭疽病	0.1-0.4公升	2,500	本葉期開始施藥。	7	共2次		10		本項新增。
山茼蒿	炭疽病	0.1-0.4公升	2,500	本葉期開始施藥。	7	共2次		10		本項新增。
紅鳳菜	炭疽病	0.1-0.4公升	2,500	本葉期開始施藥。	7	共2次		10		本項新增。
白鳳菜	炭疽病	0.1-0.4公升	2,500	本葉期開始施藥。	7	共2次		10		本項新增。
蔥	炭疽病	0.3-0.8公升	2,500	定植後開始施藥。	7	共2次		10		本項新增。
韭	炭疽病	0.3-0.8公升	2,500	定植後開始施藥。	7	共2次		10	採收韭菜花者不得使	本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									用。	
菠菜	炭疽病	0.1-0.3 公升	2,500	本葉期開始 施藥。	7	共 2 次		10		本項新增。
柑桔類	炭疽病	0.5 公 升	4,000	幼果期開始 施藥。	14	共 3 次		14		本項新增。