

## 「派地巴汀」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 27 日農授防字第 1131876003A 號公告

### 一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
派地巴汀	spiropidion + abamectin	(1) 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate (IUPAC) (2) >80% avermectin B1a: 5-O-demethyl avermectin A1a <20% avermectin B1b: 5-O-demethyl-25-de-(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a

### 二、「派地巴汀」農藥使用方法與範圍一覽表

115 g/L (11.5% w/v) 派地巴汀 水懸劑(SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
柑桔類	柑桔銹蟎	0.67 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥。	21	共 2 次		28	避免於開花期施藥。	原始登記廠商名稱：台灣先正達股份有限公司。