

「派滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 27 日農授防字第 1131876003D 號公告修正

200 g/L(20% w/v) 派滅芬 水懸劑 (SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|----------|------|--------------|-------|-------------|---------|--------|------|----------|------------------------------------|-------|
| 十字花科包葉菜類 | 黑斑病 | 0.17-0.25 公升 | 4,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 連續 2 次 | | 10 | 使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。 | 本項修正。 |
| 結球萵苣 | 黑斑病 | 0.17-0.25 公升 | 4,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 共 2 次 | | 15 | 使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。 | 本項修正。 |
| 番茄 | 早疫病 | 0.25 公升 | 4,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 連續 2 次 | | 3 | 使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。 | 本項修正。 |
| 甜椒 | 早疫病 | 0.25 公升 | 4,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 連續 2 次 | | 3 | 使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。 | 本項修正。 |
| 香蕉 | 黑星病 | 0.417 公升 | 2400 | 病害發生初期開始施藥。 | 14 | 共 4 次 | | 14 | 使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。 | 本項修正。 |
| 印度棗 | 白粉病 | 0.25 公升 | 4,000 | 病害發生初期 | 10 | 共 2 次 | | 14 | | |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|--------------------------------------|------|------------|-------|-------------------------|---------|----------|------|----------|--|--|
| | | | | 開始施藥。 | | | | | | |
| 茄子、 辣椒、 枸杞、 香瓜 茄、樹 番茄 | 早疫病 | 0.25公 升 | 4,000 | 病害發 生初期 開始施 藥。 | 7 | 連續 2次 | | 3 | 使用派滅芬之 藥劑後，避免 與非本藥劑之 核准範圍作物 輪作，以免蓄 積殘留。 | 本項新 增。 |
| 蘋果、 梨、桃 | 黑星病 | 0.25公 升 | 4,000 | 病害發 生初期 開始施 藥。 | 10 | 共2 次 | | 14 | | 本項新 增。原 始登記 廠商名 稱：台 灣先正 達股份 有限公司。 |