

「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

500 g/L (50% w/v) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花生	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
紅豆	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
甘藷	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
豆薯	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
山藥	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蘿蔔	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蕪菁	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				將稀釋液噴佈於土表。						
牛蒡	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蒜	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。					適用於蒜頭。	
薑	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
芋	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
番茄	根瘤線蟲	0.2 公升	4,000	於植株定植後第 3 天澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.3	4,000	於植株定植後					施用前請保	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	蟲	公升		澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆					施用前請保持土壤濕潤。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				灌 250-1,000 公升藥液。						
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					<ol style="list-style-type: none"> 施用前請保持土壤濕潤。 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。 	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					<ol style="list-style-type: none"> 施用前請保持土壤濕潤。 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。 	
香蕉	根瘤線蟲	0.45 公升	10,000	限苗期使用，使用前須維持根圈土壤濕						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				潤，每株澆灌2-3公升藥液。						
草莓	根瘤線蟲	0.46-0.72公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，施用前保持土壤濕潤。						
柑桔類	柑桔線蟲	0.5公升	2,000	作物春芽萌發時使用，先以適量水量潤濕土壤，再沿樹冠滴水線澆灌2公升藥液1次。					依使用方法用藥，無需訂定安全採收期。	本項新增。原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司。

400 g/L (40% w/v) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花生	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
紅豆	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
甘藷	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
豆薯	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
山藥	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蘿蔔	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蕪菁	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
牛蒡	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	蟲	升		開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
馬鈴薯	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蒜	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。					適用於蒜頭。	
洋蔥	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
胡蘿蔔	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
薑	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
芋	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
番茄	根瘤線蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植後第 3 天澆灌稀釋藥液 1 次，					施用前保持土壤濕潤。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。						
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後					施用前請保	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	蟲	公升		澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					<ol style="list-style-type: none"> 施用前請保持土壤濕潤。 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。 	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆					<ol style="list-style-type: none"> 施用前請保持土壤濕潤。 胡瓜、美濃瓜 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				灌 50-1,000 公升藥液。					嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
香蕉	根瘤線蟲	0.6 公升	7,500	限苗期使用，使用前須維持根圈土壤濕潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線蟲	0.62-0.96 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用前保持土壤濕潤。						
柑桔類	柑桔線蟲	0.6 公升	1,600	作物春芽萌發時使用，先以適量水量潤濕土壤，再沿樹冠滴水線澆灌 2 公升藥液 1 次。					依使用方法用藥，無需訂定安全採收期。	本項新增。原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司。