

# 「阿扶巴汀」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

75 g/L (7.5% w/v) 阿扶巴汀 水分散性乳劑 (DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	粉蝨類	0.67 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6	避免開花期施藥。	
甜椒	粉蝨類	0.67 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6	避免開花期施藥。	
辣椒	粉蝨類	0.67 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6	避免開花期施藥。	
茶	薊馬類	0.63 公升	2,400	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		7	1. 植株修剪後新芽萌發時易發生蟲害。 2. 避免開花期使用。	
茄子	粉蝨類	0.67 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6	避免開花期施藥。	本項新增。原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司。
枸杞										
香瓜茄										
樹番茄										