

## 「曼普歐西比」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

280 g/L (28% w/v) 曼普歐西比 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7-10	共 2 次		7		
胡瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
木瓜	果疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		
葡萄	露菌病	0.67 公升	1,800	病害發生初期開始施藥。	7-10	共 2 次		21		
十字花科小葉菜類 龍鬚菜 不結球莴苣與半結球莴苣 茼蒿 山茼蒿 紅鳳菜 白鳳菜 芳香萬壽菊 闊包菊 蒜 蔥 韭 落蔞 珠蔥	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菠菜										
羅勒										
蘿蔔	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		本項新增。
蕪菁										
山葵										
蓮霧	果疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		本項新增。
番石榴										
無花果										
胡瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		本項新增。
苦瓜										
絲瓜										
冬瓜										
南瓜										
扁蒲										
隼人瓜										
越瓜										
夏南瓜										
木鱧果										