

「枯草桿菌 KHY8」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 9 月 9 日農授防字第 1131876644A 號公告修正

1x10⁹ CFU/mL 枯草桿菌 KHY8 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
果樹	炭疽病	0.54-6公升	500	自開花初期開始施用，每7-10天使用1次，至套袋或果實採收為止。						
葡萄	晚腐病	1.6- 3.2公升	500	自開花初期開始施用，每7-10天使用1次，至套袋或果實採收為止。						
檬果	炭疽病		500	自檬果開花初期開始進行施用，至套袋為止。	7	共 10 次			全株噴濕為準。	
檬果	炭疽病		50	果實包裝前浸泡於藥液約 15 秒後取出於通風處陰乾。						
檬果	細菌性黑斑病		500	自檬果開花初期開始進行施用，至套袋為止。	7	共 10 次			全株噴濕為準。	
桃	穿孔病	2-4公升	500	自開花初期開始施用，每7-10天使用1次，至套袋或果實採收為止。						
李	穿孔病	2-4公	500	自開花初期						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		升		開始施用，每7-10天使用1次，至套袋或果實採收為止。						
柑桔類	潰瘍病	1.6-4.8公升	500	自開花初期開始施用，每7-10天使用1次，至套袋或果實採收為止。						
可可、咖啡、破布子、愛玉子、檳榔	炭疽病	0.54-6公升	500	自開花初期開始施用，每7-10天使用1次，至套袋或果實採收為止。						本項新增。

1x10⁹ CFU/g 枯草桿菌 KHY8 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	稻熱病	3公斤	400	於稻作插秧後15天、30天、40天、孕穗期及齊穗期，各施用1次。		共5次				