

## 「凡殺歐西比」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 9 月 20 日農授防字第 1131876716A 號公告

### 一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
凡殺歐西比	famoxadone+ oxathiapiprolin	(1)3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione (2)1-(4-(4-((5RS)-5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl)-1-piperidyl)-2-(5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)ethanone

### 二、「凡殺歐西比」農藥使用方法與範圍一覽表

330 g/L (33% w/v) 凡殺歐西比 濃懸乳劑 (SE)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葡萄	露菌病	0.8 公升	1,500	盛花至幼果期開始施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次，共 2 次。				60	採收前發生病害時，請選擇其他安全採收期較短之藥劑。	原始登記廠商名稱：台灣科迪華農業科技股份有限公司