

# 「鮎澤蘇力菌 NB-200」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

54% (15,000 IU/mg) 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蔬菜	鱗翅目害蟲	0.5-2.0公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次				
番茄	夜蛾類	0.5-1.0公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7					
山茶科茶類	鱗翅目害蟲	0.8-1.0公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。						
葡萄	鱗翅目害蟲	1.0-2.0公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次				本項新增。原始登記廠商名稱：台灣住友化學股份有限公司。
果樹、可可、咖啡、破布子、愛玉子、檳榔	鱗翅目害蟲	1.0-2.0公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次				
鳳梨	鱗翅目害蟲	1.0-2.0公斤	1,000	開花末期開始施藥。	7	連續 3 次				