

「亞醜蟎」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

15%(w/w) 亞醜蟎 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
胡瓜 苦瓜 木鱧果	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		本項修正。
絲瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
冬瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
南瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
扁蒲	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
隼人瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
越瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
夏南瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
洋香瓜 香瓜 西瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			6		本項修正。
瓜果類	葉蟎類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			21		重複範圍，本項刪除。
西瓜	二點葉蟎	0.3-0.5 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。		2		6		本項恢復為原登記作物品項。
香蕉	葉蟎類	0.18- 0.6 公升	1,500	害蟎發生初期施藥 1 次。				14		
木瓜	葉蟎類	0.34-1.34 公升	1,500	害蟎發生初期施藥 1 次。				14		
番荔枝	葉蟎類	0.46-1.0 公升	1,500	害蟎發生初期施藥 1 次。				14		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
百香果	葉蟬類	0.53-1.33公升	1,500	害蟬發生初期施藥1次。				14		
龍眼	葉蟬類	0.5-1.0公升	1,500	害蟬發生初期施藥1次。				14		
荔枝	葉蟬類	0.4-0.8公升	1,500	害蟬發生初期施藥1次。				14		
檬果	葉蟬類	0.6-1.34公升	1,500	害蟬發生初期施藥1次。				7		
梨 蘋果 桃 梅 李 杏 枇杷	葉蟬類	0.27-1.67公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7			6		本項修正。
印度棗	柑桔葉蟬	0.6-0.8公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7			6		本項修正。
柑桔類	葉蟬類	0.66-1.6公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7			21		
茉莉	葉蟬類	0.67-1.67公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7			7		
蔥 韭	葉蟬類	0.67-1公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7	共2次		4		本項新增。
蒜	葉蟬類	0.67-1公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7	共2次		4	適用於蒜葉。	本項新增。
珠蔥	葉蟬類	0.67-1公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7	共2次		4	適用於珠蔥葉。	本項新增。
落萐	葉蟬類	0.67-1公升	1,500	害蟬發生時開始施藥。	7	共2次		4	適用於落萐葉。	本項新增。