

「布芬淨」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435F 號公告修正

40% (w/w) 布芬淨 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蟲	0.48 公升	2,500	孕穗末期若蟲發生盛期。				15	1. 本劑對若蟲防治效果較佳。 2. 宜於水稻孕穗末期若蟲發生盛期使用一次。	
水稻	斑飛蟲	0.5 公升	加水至 15 公升	一期作插秧後 40-50 天。			1. 空中施藥：每 8 平方公分相紙內應有直徑 1,000 μ 以下之藥點 135 點以上。 2. 人力噴藥：稀釋 2,000 倍，每穗 1-2 隻斑飛蟲時。	15	避免南瓜田使用，以免藥害。	
花椰菜	銀葉粉蟲	0.67-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施		2		15		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
小葉菜 類	粉蟲類	0.6-0.9 公升	2,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	2		6		
瓜菜類	粉蟲類	0.67- 1.13 公 升	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	共 2 次		7		
瓜果類	粉蟲類	0.67- 1.13 公 升	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			15		
檬果	葉蟬類		1,200	抽穗及 開花期 害蟲發 生時開 始施 藥。	10			15	為保護授粉 昆蟲及天 敵，盛花期 避免施藥。	
檬果	檬果木 蟲	0.38- 0.81 公 升	1,200	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			15		
梨	梨木蟲	0.96 公 升	2,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	2		9		
印度棗	粉介殼 蟲類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發 生時施 藥 1 次。				6		
柑桔類	盾介殼 蟲類	1-1.5 公 升	1,500	害蟲發 生時施 藥 1 次。				18		
花木	粉蟲類	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發 生時開	7				限觀賞花卉 使用，使用	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				始施 藥。					前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	粉蟲類	0.2-0.8 公升	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7		藥液應噴到 葉背。	12		
茶	柑桔刺 粉蟲	0.5 公 升	2,000	若蟲發 生初期 施藥。				15		
咖啡	介殼蟲 類	1.0-1.5 公升	1,500	害蟲發 生時施 藥 1 次。				7		
可可	介殼蟲 類	1.0-1.5 公升	1,500	害蟲發 生時施 藥 1 次。				7		本項新 增。

25% (w/w) 布芬淨 可溼性粉劑 (WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蟲	0.8 公 斤	1,500	孕穗末 期若蟲 發生盛 期。				15	1. 本劑對 若蟲防 治效果 較佳。 2. 宜於水 稻孕穗 末期若 蟲發生 盛期使 用一 次。 3. 本劑試 驗時加	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									「新利農」展著劑3,000倍。	
水稻	斑飛蟲	0.8 公 斤	1,500	孕穗期後若蟲發生高時。			孕穗期後若蟲發生密度高時施藥一次。	15	本劑試驗時加「新利農展著劑」3,000倍。	
花椰菜	銀葉粉 蟲	1-1.2 公斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。		2		15		
芥藍	銀葉粉 蟲	1-1.5 公 斤	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	2		6		
瓜菜類	粉蟲類	1-1.7 公 斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	共 2 次		7		
瓜果類	粉蟲類	1-1.7 公 斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			15		
瓜果類	銀葉粉 蟲	1-1.7 公 斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			15		
檬果	葉蟬類		750	抽穗及 開花期 害蟲發 生時開 始施 藥。	10			15	為保護授粉 昆蟲及天敵，盛花期 避免施藥。 2.本劑試驗 時加展著劑 「新利農」 3,000倍。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
檬果	檬果木 蟲	0.6-1.3 公斤	750	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			15		
梨	梨木蟲	1.6 公 斤	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	2		9		
花木	粉蟲類	0.6-1.2 公斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
花木	銀葉粉 蟲		1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7		應噴到葉 背。		限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	粉蟲類	0.3-1.2 公斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7		藥液應噴到 葉背。	12		
菊	溫室粉 蟲	0.6-1.2 公斤	1,000	發現葉 片有溫 室粉蟲 時開始 施藥。	7		藥液應噴到 葉背。			
咖啡	介殼蟲 類	1.6-2.4 公斤	1,000	害蟲發 生時施 藥 1 次。				7		
可可	介殼蟲 類	1.6-2.4 公斤	1,000	害蟲發 生時施 藥 1 次。				7		本項新 增。