

「氣派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 3 月 14 日農授防字第 1141875452E 號公告修正

500 g/L (50% w/v) 氣派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
落花生	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
紅豆	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
甘藷	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
豆薯	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
山藥	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蘿蔔	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
蕪菁	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				將稀釋液噴佈於土表。						
牛蒡	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
馬鈴薯	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
蒜	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。					適用於蒜頭。	
洋蔥	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
胡蘿蔔	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
薑	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
芋	根瘤線蟲	0.4 公升	4,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線蟲	0.2 公升	4,000	於植株定植後第 3 天澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆					施用前請保持土壤濕潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				灌 250-1,000 公升藥液。						
香瓜茄	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
樹番茄	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
瓜菜類	根瘤線 蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 50-1,000 公 升藥液。					1. 施用前 請保持 土壤濕 潤。 2. 胡瓜、 美濃瓜 嫩葉接 觸到較 高劑量 氟派瑞 時，會 引起葉 緣發生 黃白化 藥斑之 現象。	
瓜果類	根瘤線 蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌					1. 施用前 請保持 土壤濕	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					2. 潤。 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
香蕉	根瘤線蟲	0.45 公升	10,000	限苗期使用，使用前須維持根圈土壤濕潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線蟲	0.46-0.72 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用前保持土壤濕潤。						
柑桔類	柑桔線蟲	0.5 公升	2000	作物春芽萌發時使用，先以適量水量潤濕土壤，再沿樹冠滴水線澆灌 2 公升藥液 1 次。					依使用方法用藥，無需訂定安全採收期。	
番石榴	根瘤線蟲	0.25 公升	18,000	新芽萌發時使用，先以適量水量潤濕土壤，再沿樹冠滴水線澆灌 5					1. 施藥前保持樹冠下土壤濕潤。	本項新增。原始登記廠商名稱：台

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				公升藥液 1 次。					2. <u>每株澆灌 5 公升藥液為限。</u> 3. <u>限新芽萌發時澆灌使用。</u>	灣拜耳股份有限公司。

400 g/L (40% w/v) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
山藥	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
牛蒡	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
									緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
甘藷	根瘤線蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
芋	根瘤線蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤濕潤。						
豆薯	根瘤線蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展開時，於土壤濕潤情形下，將稀釋液噴佈於土表。						
枸杞	根瘤線	0.1-0.4	3,000	於植株定植後					施用前請保	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
	蟲	公升		澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公升藥液。					持土壤濕 潤。	
柑桔類	柑桔線 蟲	0.6 公 升	1600	作物春芽萌發 時使用，先以 適量水量潤濕 土壤，再沿樹 冠滴水線澆灌 2 公升藥液 1 次。					依使用方法 用藥，無需 訂定安全採 收期。	
洋蔥	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前 請保持土壤濕 潤。						
紅豆	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展 開時，於土壤 濕潤情形下， 將稀釋液噴佈 於土表。						
胡蘿蔔	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展 開時，於土壤 濕潤情形下， 將稀釋液噴佈 於土表。						
茄子	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000					施用前請保 持土壤濕 潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
				公升藥液。						
香瓜茄	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
香蕉	根瘤線 蟲	0.6 公 升	7,500	限苗期使用， 使用前須維持 根圈土壤濕 潤，每株澆灌 2-3 公升藥 液。						
草莓	根瘤線 蟲	0.62- 0.96 公 升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用 前保持土壤濕 潤。						
馬鈴薯	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前 請保持土壤濕 潤。						
甜椒	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
番茄	根瘤線 蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植後 第 3 天澆灌稀					施用前保持 土壤濕潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
				釋藥液 1 次， 每株澆灌 40 毫升，或每公 頃澆灌 800 公 升藥液。						
落花生	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展 開時，於土壤 濕潤情形下， 將稀釋液噴佈 於土表。						
蒜	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前 請保持土壤濕 潤。					適用於蒜 頭。	
辣椒	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
樹番茄	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後 澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依 植株栽培密 度，每公頃澆 灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保 持土壤濕 潤。	
蕪菁	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展 開時，於土壤 濕潤情形下， 將稀釋液噴佈 於土表。						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期 (天)	注意事項	說明
薑	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前 請保持土壤濕 潤。						
蘿蔔	根瘤線 蟲	0.5 公 升	3,000	播種後子葉展 開時，於土壤 濕潤情形下， 將稀釋液噴佈 於土表。						
番石榴	根瘤線 蟲	0.3 公 升	15,000	新芽萌發時使 用，先以適量 水量潤濕土 壤，再沿樹冠 滴水線澆灌 5 公升藥液 1 次。					1. <u>施藥前保持樹冠下土壤濕潤。</u> 2. <u>每株澆灌 5 公升藥液為限。</u> 3. <u>限新芽萌發時澆灌使用。</u>	本項新增。原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司。