

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「曼普歐西比」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

280 g/L (28% w/v) 曼普歐西比 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7-10	共 2 次		7		
十字花科小葉菜類	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
不結球萵苣與半結球萵苣	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
茼蒿	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
山茼蒿	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
紅鳳菜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
白鳳菜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
芳香萬壽菊	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
闊包菊	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
蒜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
蔥	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
韭	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
蔞蕎	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
珠蔥	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
龍鬚菜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
羅勒	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
菠菜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
蘿蔔	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		
蕪菁	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		
山葵	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		
胡瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
胡瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		重複範圍，本項刪除。
苦瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
絲瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
冬瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
南瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
扁蒲	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
隼人瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
越瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
夏南瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
木鱧果	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
木瓜	果疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		
葡萄	露菌病	0.67 公升	1,800	病害發生初期開始施藥。	7-10	共 2 次		21		
蓮霧	疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		
番石榴	疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		
無花果	疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初	7	共 3 次		14		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		升		期開始施藥。		次				
番茄	晚疫病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		本項新增。原始登記廠商名稱：台灣先正達股份有限公司。