

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

## 「殺紋依得利」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

45%(w/w) 殺紋依得利 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜菜類	立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	瓜類育苗期：瓜類種子播種後，立即於穴盤上均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
瓜菜類	立枯病	100 毫升/株	1,500	瓜類移植期：瓜類瓜苗定植後，於移植穴立即澆灌稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
瓜果類	立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	瓜類育苗期：瓜類種子播種後，立即於穴盤上均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
瓜果類	立枯病	100 毫升/株	1,500	瓜類移植期：瓜類瓜苗定植後，於移植穴立即澆灌稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
十字花科小葉菜類 不結球萵苣與半結球萵苣	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	本項新增。

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茼蒿										
紅鳳菜										
白鳳菜										
山茼蒿										
芳香萬壽菊										
闊包菊										
蔥										
韭										
芹菜										
蘿菜										
菠菜										
莧菜										
山芹菜										
芫荽										
艾草										
茴香										
蒜	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。適用於蒜葉。	
珠蔥									僅限苗期使用。適用於珠蔥葉。	
落蕎									僅限苗期使用。適用於落蕎葉。	
甜菜									僅限苗期使用。適用於葉用甜菜。	
甘藷									僅限苗期使用。適用於葉用甘藷。	
黑婆羅門參									僅限苗期使用。適用於黑婆羅門參葉。	