

「賽速安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 6 月 10 日農授防字第 1141875890E 號公告修正

300 g/L (30% w/v)賽速安勃 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	夜蛾類	1.7 毫 升	300	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 300 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	稻螟蛉	1.7 毫 升	300	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 300 毫 升。		限育苗箱使 用。	大類範 圍重 疊，本 項刪 除。
水稻	樹蔭蝶	1.7 毫 升	300	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 300 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	稻苞蟲	1.7 毫 升	300	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 300 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	稻心蠅	1.7 毫	300	插秧前			插秧前 24		限育苗箱使	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		升		24 小 時。			小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 300 毫 升。		用。	
十字花 科包葉 菜類	菜心螟	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	大菜螟	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	夜蛾類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	紋白蝶	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	毒蛾類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停 止施藥。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停 止施藥。	
菊科包 葉菜類	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		12		
菊科包 葉菜類	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		12		
薤菜	夜蛾類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6	禁用於水域 栽培薤菜。	
薤菜	毒蛾類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6	禁用於水域 栽培薤菜。	
甘藷	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6	適用於葉用 甘藷。	
甘藷	蝦蟇天 蛾	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6	適用於葉用 甘藷。	
甘藷	鳥羽蛾 類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6	適用於葉用 甘藷。	
甘藷	金花蟲 類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6	適用於葉用 甘藷。	
豌豆	螟蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
豌豆	夜蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
豌豆	毒蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施	7			9	適用於葉用 豌豆。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
十字花 科小葉 菜類	菜心螟	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	大菜螟	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	夜蛾類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	小菜蛾	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	紋白蝶	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	毒蛾類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
菊科小 葉菜類	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
菊科小 葉菜類	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
茄科小 葉菜類	夜蛾類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
茄科小 葉菜類	毒蛾類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
茄科小 葉菜類	植食性 瓢蟲類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
蔥科小 葉菜類	夜蛾類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		9		
蔥科小 葉菜類	毒蛾類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		9		
蔥	夜蛾類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
芹菜	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
芹菜	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
羅勒	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
羅勒	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
紫蘇	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
紫蘇	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
菠菜	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
菠菜	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
菠菜	甜菜白 帶野螟 蛾	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
莧菜	夜蛾類	0.1-0.3	3,000	害蟲發生	7	共		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。		1-2 次				
莧菜	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
莧菜	甜菜白 帶野螟 蛾	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
豆薯	螟蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆薯	夜蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆薯	毒蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
茄科果 菜類	夜蛾類	0.1-0.4 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 1-2 次		6		
番茄	夜蛾類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時施藥 1 次。	7			6		
豆菜類	螟蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	夜蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	毒蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
草莓	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
花木	夜蛾類	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施	7	最多 2 次			1. 限觀賞 花卉使	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。					用，使 使用前宜 先進行 小面積 藥害測 試。 2. 避免於 開花期 使用。	
落花 生、 綠豆、 紅豆、 大豆、 花豆、 樹豆、 豇豆	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		21	適用於乾 豆。	本項新 增。

40(%) (w/w)賽速安勃 水分散性粒劑 (WG)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	瘤野螟	1.0 公 克	500	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	夜蛾類	1.0 公 克	500	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育		限育苗箱使 用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
							苗箱稀釋水 量 500 毫 升。			
水稻	稻螟蛉	1.0 公 克	500	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	大類範 圍重 疊，本 項刪 除。
水稻	樹蔭蝶	1.0 公 克	500	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	稻苞蟲	1.0 公 克	500	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	稻心蠅	1.0 公 克	500	插秧前 24 小 時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	
十字花 科包葉	菜心螟	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施	7			12	包葉菜類採 收前 12 天	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
菜類				藥。					(設施栽培 18天)停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	大菜螟	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前12天 (設施栽培 18天)停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	夜蛾類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前12天 (設施栽培 18天)停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	紋白蝶	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前12天 (設施栽培 18天)停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	毒蛾類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前12天 (設施栽培 18天)停 止施藥。	
十字花 科包葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前12天 (設施栽培 18天)停 止施藥。	
豌豆	螟蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
豌豆	夜蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
豌豆	毒蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科小葉菜類	菜心螟	0.3-0.4公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	小葉菜類採收前9天（設施栽培15天）停止施藥。	
十字花科小葉菜類	大菜螟	0.3-0.4公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	小葉菜類採收前9天（設施栽培15天）停止施藥。	
十字花科小葉菜類	夜蛾類	0.3-0.4公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	小葉菜類採收前9天（設施栽培15天）停止施藥。	
十字花科小葉菜類	紋白蝶	0.3-0.4公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	小葉菜類採收前9天（設施栽培15天）停止施藥。	
十字花科小葉菜類	毒蛾類	0.3-0.4公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	小葉菜類採收前9天（設施栽培15天）停止施藥。	
十字花科小葉菜類	植食性瓢蟲類	0.3-0.4公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	小葉菜類採收前9天（設施栽培15天）停止施藥。	
豆薯	螟蛾類	0.1-0.2公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
豆薯	夜蛾類	0.1-0.2公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
豆薯	毒蛾類	0.1-0.2公斤	5,000	害蟲發生	7			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公斤		時開始施 藥。						
豆菜類	螟蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	夜蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	毒蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
草莓	夜蛾類	0.2-0.5 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		