

## 「庫斯蘇力菌 ABTS-351」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 6 月 10 日農授防字第 1141875890F 號公告修正

### 2.3% (1,600 IU/mg) 庫斯蘇力菌 ABTS-351 粒劑 (GR)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期                 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法       | 安全採收期(天) | 注意事項                                  | 說明 |
|------|------|---------|------|----------------------|---------|------|------------|----------|---------------------------------------|----|
| 玉米   | 玉米螟  | 5 公斤    |      | 輪生初、中期；雄花抽穗前；雌花吐絲後施藥 |         |      | 將藥粒平均施於心葉。 |          | 輪生初、中期；雄花抽穗前 4-5 天；雌花吐絲後 3-4 天，各施藥一次。 |    |

### 54% (32,000 IU/mg) 庫斯蘇力菌 ABTS-351 水分散性粒劑 (WG)

| 作物名稱     | 病蟲名稱  | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數  | 使用時期       | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|----------|-------|-------------|-------|------------|---------|------|------|----------|------|----|
| 蔬菜       | 鱗翅目害蟲 | 0.5-0.75 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |      |      |          |      |    |
| 油茶       | 鱗翅目害蟲 | 0.5 公斤      | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |      |      |          |      |    |
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶   | 0.5-1.0 公斤  | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |      |      |          |      |    |
| 十字花科小葉菜類 | 紋白蝶   | 0.5-1.0 公斤  | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |      |      |          |      |    |
| 十字花科根菜類  | 紋白蝶   | 0.5-1.0 公斤  | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |      |      |          |      |    |
| 山茶       | 鱗翅目害蟲 | 0.5 公斤      | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |      |      |          |      |    |
| 茶        | 鱗翅目害蟲 | 0.5 公斤      | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |      |      |          |      |    |

| 作物名稱       | 病蟲名稱      | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數  | 使用時期       | 施藥間隔(天) | 施藥次數     | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明                          |
|------------|-----------|---------|-------|------------|---------|----------|------|----------|------|-----------------------------|
| 禾本科<br>雜糧類 | 鱗翅目<br>害蟲 | 1 公斤    | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 連續 3-6 次 |      |          |      | 本項新增。原始登記廠商名稱：台灣住友化學股份有限公司。 |

23.7% (16,000 IU/mg) 庫斯蘇力菌 ABTS-351 可溼性粉劑 (WP)

| 作物名稱     | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量    | 稀釋倍數  | 使用時期       | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                                         | 說明 |
|----------|------|------------|-------|------------|---------|------|------|----------|----------------------------------------------|----|
| 玉米       | 玉米螟  | 1.6-2 公斤   | 600   | 輪生期施藥。     |         |      |      |          | 雄花抽穗,吐絲初,吐絲後及全吐絲後 5 天各一次,展著劑 YAMATO 3,000 倍。 |    |
| 十字花科包葉菜類 | 菜心螟  |            | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10      |      |      |          |                                              |    |
| 十字花科包葉菜類 | 大菜螟  |            | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 10      |      |      |          |                                              |    |
| 十字花科包葉菜類 | 擬尺蠖  | 0.4-0.6 公斤 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10    |      |      |          |                                              |    |
| 十字花科包葉菜類 | 小菜蛾  | 0.4-0.6 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10    |      |      |          |                                              |    |
| 十字花科包葉菜類 | 紋白蝶  | 0.4-0.6 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7-10    |      |      |          |                                              |    |
| 十字花      | 菜心螟  |            | 1,500 | 害蟲發生       | 10      |      |      |          |                                              |    |

| 作物<br>名稱         | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期               | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                           | 說明 |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------------------------------------------|----|
| 科小葉<br>菜類        |          |                 |          | 時開始施<br>藥。         |                 |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類 | 大菜螟      |                 | 1,500    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 10              |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類 | 擬尺蠖      | 0.4-0.6<br>公斤   | 2,000    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7-10            |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類 | 小菜蛾      | 0.4-0.6<br>公斤   | 1,000    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7-10            |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類 | 紋白蝶      | 0.4-0.6<br>公斤   | 1,500    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7-10            |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科根菜<br>類  | 菜心螟      |                 | 1,500    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 10              |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科根菜<br>類  | 大菜螟      |                 | 1,500    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 10              |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科根菜<br>類  | 擬尺蠖      | 0.4-0.6<br>公斤   | 2,000    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7-10            |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科根菜<br>類  | 小菜蛾      | 0.4-0.6<br>公斤   | 1,000    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7-10            |          |          |                  |                                                |    |
| 十字花<br>科根菜<br>類  | 紋白蝶      | 0.4-0.6<br>公斤   | 1,500    | 害蟲發生<br>時開始施<br>藥。 | 7-10            |          |          |                  |                                                |    |
| 茶                | 茶蠶       | 0.5 公<br>斤      | 2,000    |                    |                 |          |          |                  | 1. 盡量在幼<br>齡時期施<br>藥。<br>2. 發生茶叢<br>行局部施<br>藥。 |    |