

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「克凡派」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

10% (w/w) 克凡派 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
紅豆、 大豆、 綠豆、 花豆、 樹豆、 豇豆、 蠶豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			30	<u>適用於乾 豆。</u>	本項修 正。
紅豆、 大豆、 綠豆、 花豆、 樹豆、 豇豆、 蠶豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			30	<u>適用於乾 豆。</u>	本項修 正。
油菜	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			30	<u>適用於油 菜籽。避 免於開花 期使用。</u>	本項修 正。
油菜	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			30	<u>適用於油 菜籽。避 免於開花 期使用。</u>	本項修 正。
向日葵	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			30	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
向日葵	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			30	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
向日葵	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			30	<u>避免於開 花期使 用。</u>	
油茶	夜蛾類	1-3 公	1,000	害蟲發生	7			21	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		升		時開始施藥。					花期使 用。	正。
油茶	毒蛾類	1-3 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21	避免於開 花期使 用。	本項修 正。
胡麻	夜蛾類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			30		
胡麻	薊馬類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15	採籽前 15 天停止施 藥。	
十字花 科包葉 菜類	夜蛾類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14	避免於開 花期使 用。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14	避免於開 花期使 用。	本項修 正。
十字花 科包葉 菜類	毒蛾類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14	避免於開 花期使 用。	
結球蕪 苣	夜蛾類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		本項修 正。
結球蕪 苣	毒蛾類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		本項修 正。
結球蕪 苣	薊馬類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		本項修 正。
小葉菜 類	鱗翅目 害蟲	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
旋花科 小葉菜 類	夜蛾類	0.3-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
豌豆	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施	7			10	適用於葉 用豌豆。	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
豌豆	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於葉 用豌豆。	
豌豆	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於葉 用豌豆。	
豌豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於葉 用豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免於開 花期使 用。	
十字花 科小葉 菜類	小菜蛾	1 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	<u>避免於開</u> <u>花期使</u> <u>用。</u>	本項修 正。
十字花 科小葉 菜類	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免於開 花期使 用。	
菊科小 葉菜類	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
菊科小 葉菜類	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
菊科小 葉菜類	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
茼蒿	夜蛾類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
茄科小 葉菜類	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
枸杞	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於枸 杞葉。	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
蔥科小 葉菜類	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
蔥科小 葉菜類	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
韭	薊馬類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	3		9		
龍鬚菜	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	避免於開 花期使 用。	
龍鬚菜	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
芹菜	夜蛾類	0.3-3 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
芫荽	夜蛾類	0.3-3 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
羅勒	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
紫蘇	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
仙草	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
薄荷	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
菠菜	夜蛾類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
菠菜	薊馬類	0.3-0.8	1,000	害蟲發生	7			10		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。						
甜菜	薊馬類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10	適用於葉 用甜菜。	
莧菜	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
莧菜	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
莧菜	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
山蘇	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
山蘇	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
過溝菜 蕨	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
過溝菜 蕨	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
落葵	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
落葵	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
香椿	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
香椿	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
甘藷	夜蛾類	0.3-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		本項修 正。
豆薯、 狗尾 草、闊 葉大豆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		本項修 正。
豆薯	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		與大類範 圍重疊， 本項刪除。
豆薯	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		與大類範 圍重疊， 本項刪除。
豆薯	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		與大類範 圍重疊， 本項刪除。
豆薯	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
狗尾草	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
闊葉大 豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
山藥	夜蛾類	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
山藥	黑盲椿 象	0.8-1.0 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		6		
山藥	薊馬類	0.8-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施	7			6		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
山藥	優美蘭 葉蜂	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
蘿蔔	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	避免於開 花期使用。 <u>適用於蘿 蔔根。</u>	本項修 正。
蕪菁	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	避免於開 花期使用。	
山葵	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	避免於開 花期使用。 <u>適用於山 葵根莖。</u>	
蘿蔔	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	避免於開 花期使用。 <u>適用於蘿 蔔根。</u>	本項修 正。
蕪菁	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	避免於開 花期使用。	
山葵	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	避免於開 花期使用。 <u>適用於山 葵根莖。</u>	
牛蒡	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		本項修 正。
牛蒡	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		本項修 正。
牛蒡	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		本項修 正。
馬鈴薯	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		本項修 正。

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
馬鈴薯	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
洋蔥	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本項修 正。
落蕎	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	<u>適用於落 蕎頭。</u>	
珠蔥	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	<u>適用於紅 蔥頭。</u>	
蒜	夜蛾類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	<u>適用於蒜 頭。</u>	
洋蔥	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本項修 正。
落蕎	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	<u>適用於落 蕎頭。</u>	
珠蔥	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	<u>適用於紅 蔥頭。</u>	
蒜	薊馬類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	<u>適用於蒜 頭。</u>	
胡蘿蔔	夜蛾類	0.8-1.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	<u>適用於胡 蘿蔔根。</u>	本項修 正。
甜菜	薊馬類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3	適用於甜 菜根。	
薑	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
金針	夜蛾類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	適用於碧玉筍。	
金針	薊馬類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	適用於碧玉筍。	
芋	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
芋	天蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
蘆筍	夜蛾類	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3	<u>避免於開花期使用。</u>	本項修正。
蘆筍	薊馬類	1-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3	<u>避免於開花期使用。</u>	
<u>甜椒、</u> <u>辣椒、</u> <u>茄子、</u> <u>枸杞、</u> <u>香瓜</u> <u>茄、樹</u> <u>番茄</u>	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		本項修正。
<u>番茄、</u> <u>甜椒、</u> <u>辣椒、</u> <u>茄子、</u> <u>枸杞、</u> <u>香瓜</u> <u>茄、樹</u> <u>番茄</u>	薊馬類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		本項修正。
番茄	夜蛾類	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
金針	夜蛾類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生	7			9	適用於金	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		升		時開始施藥。					針花。	
金針	薊馬類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	適用於金針花。	
洛神葵	夜蛾類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
秋葵	夜蛾類	0.4-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
秋葵	薊馬類	0.4-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
瓜菜類	夜蛾類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多 2 次		6	避免於開花期使用	
瓜菜類	薊馬類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多 2 次		6	避免於開花期使用	
<u>菜豆</u> 、 <u>豌豆</u> 、 <u>花豆</u> 、 <u>樹豆</u> 、 <u>萊豆</u> 、 <u>蠶豆</u> 、 <u>扁豆</u> 、 <u>翼豆</u> 、 <u>刀豆</u> 、 <u>鷹嘴</u> <u>豆</u> 、 <u>豇豆</u>	螟蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			18	<u>適用於鮮豆。</u>	本項修正。
<u>菜豆</u> 、 <u>花豆</u> 、 <u>樹豆</u> 、 <u>萊豆</u> 、 <u>蠶豆</u> 、	夜蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			18	<u>適用於鮮豆。</u>	本項修正。

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
<u>扁豆</u> 、 <u>翼豆</u> 、 <u>刀豆</u> 、 <u>鷹嘴</u> <u>豆</u> 、 <u>豇</u> <u>豆</u>										
<u>菜豆</u> 、 <u>豌豆</u> 、 <u>花豆</u> 、 <u>樹豆</u> 、 <u>菜豆</u> 、 <u>蠶豆</u> 、 <u>扁豆</u> 、 <u>翼豆</u> 、 <u>刀豆</u> 、 <u>鷹嘴</u> <u>豆</u> 、 <u>豇</u> <u>豆</u>	毒蛾類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			18	<u>適用於鮮 豆。</u>	本項修 正。
花豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
樹豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
豌豆	夜蛾類	0.5-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			18	<u>適用於鮮 豆。</u>	本項修 正。
豌豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
菜豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			18	適用於鮮 豆。	
蠶豆	薊馬類	0.5-0.8	1,000	害蟲發生	7			18	適用於鮮	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。					豆。	
扁豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			18	適用於鮮豆。	
翼豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			18	適用於鮮豆。	
刀豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			18	適用於鮮豆。	
豇豆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			18	適用於鮮豆。	
瓜果類	夜蛾類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	避免於開花期使用。	
瓜果類	薊馬類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	避免於開花期使用。	重複範圍，本項刪除。
瓜果類	薊馬類	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	避免於開花期使用。	本項修正。
酪梨	夜蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			12		
酪梨	毒蛾類	1-2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			12		
百香果	夜蛾類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			12		
百香果	毒蛾類	0.8-2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施藥。	7			12		
百香果	葉蟻類	0.5-1 公升	2,000	害蟻發生 時開始施	7			12		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
葡萄	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	結果期害 蟲發生時 開始施 藥。	10			30	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
楊桃	薊馬類	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
蓮霧	薊馬類	0.6-2 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。				12	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
番石榴	薊馬類	0.8-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
檬果	薊馬類	1.5-2.0 公升	1,000	薊馬發生 初期。	7	最多 2 次		12		
楊梅	夜蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
楊梅	毒蛾類	1-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
梨	薊馬類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
梨	葉蟬類	0.5-0.7 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	10			15	<u>避免於開 花期使 用。</u>	本項修 正。
蘋果	夜蛾類	0.4-2.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
蘋果	毒蛾類	0.4-2.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
蘋果	葉蟬類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			15		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
桃	葉蠅類	0.5-1.0 公升	2,000	害蠅發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開 花期使 用。	本項修 正。
梅	薊馬類	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開 花期使 用。	本項修 正。
梅	葉蠅類	0.6-0.9 公升	2,000	害蠅發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開 花期使 用。	本項修 正。
李	薊馬類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開 花期使 用。	本項修 正。
枇杷	薊馬類	1-1.3 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開 花期使 用。	本項修 正。
枇杷	葉蠅類	0.8-1.0 公升	2,000	害蠅發生 時開始施 藥。	7			15	避免於開 花期使 用。	本項修 正。
印度 棗、棗	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		本項修 正。
印度 棗、棗	毒蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		本項修 正。
印度 棗、棗	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		本項修 正。
鼠李科 梨果類	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		重複範 圍，本項 刪除。
鼠李科 梨果類	葉蠅類	0.4-0.6 公升	2,000	害蠅發生 時開始施 藥。	7			15		重複範 圍，本項 刪除。
印度 棗、棗	葉蠅類	0.4-0.6 公升	2,000	害蠅發生 時開始施 藥。	7			15		本項修 正。
柿	薊馬類	0.7-1 公	1,500	害蟲發生	7			15		

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		升		時開始施藥。						
柑桔類	薊馬類	1-2.4 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	<u>避免於開花期使用。</u>	本項修正。
花木	夜蛾類	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
花木	薊馬類	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	夜蛾類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
菊	毒蛾類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
菊	薊馬類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
洋甘菊	薊馬類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
茉莉	薊馬類	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
茶	葉蠅類	1 公升	1,000	害蠅發生時開始施藥。				21	<u>避免於開花期使用。</u>	本項修正。
茶	神澤氏葉蠅	1 公升	1,000	害蠅發生時開始施				21	<u>避免於開花期使用。</u>	本項修正。

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。					用。	
黃耆	鱗翅目 害蟲	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
黃耆	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
風茹	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
風茹	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
風茹	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
艾草	夜蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
艾草	毒蛾類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
艾草	薊馬類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
當歸	夜蛾類	0.3-3 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
丹參	夜蛾類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
薑黃	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及 稀釋倍數 依輸入國	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									之規定處 理。	
草莓	二點葉 蟻	1.25 公 升	800	害蠶發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		2		本項新 增。原始 登記廠商 名稱：台 灣巴斯夫 股份有限 公司。