

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

## 「三氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

三氟派瑞 水懸劑 (SC) 500 g/L (50% w/v)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
結球萬 苣	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
十字花 科小葉 菜類	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
不結球 萬苣與 半結球 萬苣	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
茼蒿	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
山茼蒿	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
紅鳳菜	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
白鳳菜	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
蔥	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	定植後開 始施藥。	7	共 2 次		10	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
韭	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	定植後開 始施藥。	7	共 2 次		10	採收韭菜花 者不得使 用。避免重 複使用含氟 派瑞藥劑。	本項修 正。

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
菠菜	炭疽病	0.1-0.3 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共2 次		10	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
番茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共2 次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
甜椒	炭疽病	0.4 公 升	2,500	病害發生 初期開始 施藥，全 株均勻噴 施。	7	共2 次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
辣椒	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共2 次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
茄子	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共2 次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
枸杞	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共2 次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
香瓜茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共2 次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
樹番茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共2 次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
瓜菜類	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
胡瓜	白粉病	0.1 公 升	9,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	共2 次		3	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
瓜果類	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
香蕉	炭疽病	0.09-0.3 公升	4,000	謝花幼果 期開始施	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。					藥劑。	
木瓜	炭疽病	0.2-0.7 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
番荔枝	炭疽病	0.2-0.5 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
酪梨	炭疽病	0.3-0.7 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
紅龍果	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
百香果	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
紅毛丹	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
草莓	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	謝花幼果 期開始施 藥。	7	2		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
葡萄	晚腐病	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
楊桃	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
蓮霧	炭疽病	0.3-1 公 升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
番石榴	炭疽病	0.4-0.7 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
無花果	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
龍眼	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
荔枝	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
檬果	炭疽病	0.3 公 升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	結果後每隔 14 天施藥 1 次至套袋前 為止。避免 重複使用含 氟派瑞藥 劑。	本項修 正。
梨	炭疽病	0.3 公 升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14	共 3 次		14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
蘋果	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14	最多 4 次		14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
桃	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14	最多 4 次		14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
梅	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14	最多 4 次		14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
印度棗	炭疽病	0.3-0.4 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14	最多 4 次		14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
柿	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
柑桔類	炭疽病	0.5 公 升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14	共 3 次		14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
椰子	炭疽病	0.2-0.7 公升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14			18	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
山茶科 茶類	赤葉枯 病	0.3-1 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	14			14	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項修 正。
菜豆、 豌豆	炭疽病	0.4 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		7	避免重複使 用含氟派瑞 藥劑。	本項新 增。