

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「殺紋依得利」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

45% (w/w) 殺紋依得利 可濕性粉劑 (WP)

| 作物 名稱 | 病蟲 名稱 | 每公頃 每次用 量 | 稀釋 倍數 | 使用時期 | 施藥 間隔 (天) | 施藥 次數 | 施藥 方法 | 安全採 收期 (天) | 注意事項 | 說明 |
|-------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------------------------|----|
| 蕹菜 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 甘藷 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。適用於 葉用甘藷。 | |
| 十字花 科小葉 菜類 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 不結球 萐苣與 半結球 萐苣 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 茼蒿 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 山茼蒿 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 紅鳳菜 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 白鳳菜 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 芳香萬 | 苗立枯 | 2 公克/ | 1,500 | 播種後均 | | | | | 僅限苗期使 | |

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

| 作物 名稱 | 病蟲 名稱 | 每公頃 每次用 量 | 稀釋 倍數 | 使用時期 | 施藥 間隔 (天) | 施藥 次數 | 施藥 方法 | 安全採 收期 (天) | 注意事項 | 說明 |
|------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|----------------------------------------|-----------|
| 壽菊 | 病 | 平方公 尺 | | 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 用。 | |
| 闊包菊 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| <u>婆羅門 參</u> | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 <u>適用於 婆羅門參 葉。</u> | 本項修 正。 |
| 蒜 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。適用於 蒜葉。 | |
| 蔥 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 韭 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 落蕎 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。適用於 落蕎葉。 | |
| 珠蔥 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。適用於 珠蔥葉。 | |
| 芹菜 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 芫荽 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

| 作物 名稱 | 病蟲 名稱 | 每公頃 每次用 量 | 稀釋 倍數 | 使用時期 | 施藥 間隔 (天) | 施藥 次數 | 施藥 方法 | 安全採 收期 (天) | 注意事項 | 說明 |
|----------|----------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-----------------|----|
| | | 尺 | | 釋液 1 次。 | | | | | | |
| 茴香 | 苗立枯病 | 2 公克/平方公尺 | 1,500 | 播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使用。 | |
| 山芹菜 | 苗立枯病 | 2 公克/平方公尺 | 1,500 | 播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使用。 | |
| 菠菜 | 苗立枯病 | 2 公克/平方公尺 | 1,500 | 播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使用。 | |
| 甜菜 | 苗立枯病 | 2 公克/平方公尺 | 1,500 | 播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使用。適用於葉用甜菜。 | |
| 莧菜 | 苗立枯病 | 2 公克/平方公尺 | 1,500 | 播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使用。 | |
| 瓜菜類 | 立枯病 | 2 公克/平方公尺 | 1,500 | 瓜類育苗期：瓜類種子播種後，立即於穴盤上均勻澆淋稀釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使用。 | |
| 瓜菜類 | 立枯病 | 100 毫升/株 | 1,500 | 瓜類移植期：瓜類瓜苗定植後，於移植穴立即澆灌稀釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使用。 | |

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

| 作物 名稱 | 病蟲 名稱 | 每公頃 每次用 量 | 稀釋 倍數 | 使用時期 | 施藥 間隔 (天) | 施藥 次數 | 施藥 方法 | 安全採 收期 (天) | 注意事項 | 說明 |
|----------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------------|----|
| 瓜果類 | 立枯病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 瓜類育苗 期：瓜類 種子播種 後，立即 於穴盤上 均勻澆淋 稀釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 瓜果類 | 立枯病 | 100 毫 升/株 | 1,500 | 瓜類移植 期：瓜類 瓜苗定植 後，於移 植穴立即 澆灌稀釋 液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |
| 艾草 | 苗立枯 病 | 2 公克/ 平方公 尺 | 1,500 | 播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。 | | | | | 僅限苗期使 用。 | |