

「阿扶平」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 9 月 3 日農授防字第 1141876337A 號公告修正

50 g/L (5% w/v) 阿扶平 水分散性乳劑 (DC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
番茄	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次		6		
甜椒	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次		6		
辣椒	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次		6		
茄子	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次		6		
枸杞	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次		6		
香瓜茄	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次		6		
樹番茄	粉蝨類	0.7-1 公升	1,200	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次		6		
胡瓜	粉蝨類	0.67-1 公升	1,200	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次		3		
洋香瓜、 香瓜	粉蝨類	<u>0.67-1</u> <u>公升</u>	<u>1,200</u>	<u>害蟲發生時</u> <u>開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>共 2 次</u>		<u>3</u>		本項新 增。