

「鮎澤蘇力菌 Ab12」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 9 月 3 日農授防字第 1141876337I 號公告修正

60% (30,000 DBMU/mg) 鮎澤蘇力菌 Ab12 可溼性粉劑 (WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
甘藍	小菜蛾	1.3-1.6 公斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次			儘量於陰天 或下午施 藥，可減少 藥效降低之 情形發生， 拆封後請短 期內用完， 如未用完請 密封並置於 乾燥陰涼 處。	本 項 修 正，原注 意 事 項 文 字 移 由 產 品 特 性 中 整 體 說 明 揭 露。
十字花 科小葉 菜、十 字花科 包葉菜 類、十 字花科 根菜類	鱗翅目 害蟲	1.3-1.6 公斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				本項新 增。
乾豆類	夜蛾類	1.3-1.6 公斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				本項新 增。
大豆	夜蛾類	1.3-1.6 公斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次			適用於毛 豆。	本項新 增。