

「殺紋依得利」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 9 月 3 日農授防字第 1141876337J 號公告修正
45(%) (w/w) 殺紋依得利 可溼性粉劑 (WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
薤菜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
甘藷	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。適用於 葉用甘藷。	
十字花 科小葉 菜類	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
不結球 萵苣與 半結球 萵苣	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
茼蒿	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
山茼蒿	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
紅鳳菜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
白鳳菜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
芳香萬	苗立枯	2 公克/	1,500	播種後均					僅限苗期使	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
壽菊	病	平方公尺		勻澆淋稀 釋液 1 次。					用。	
闊包菊	苗立枯 病	2 公克/ 平方公尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
<u>婆羅門 參</u>	苗立枯 病	2 公克/ 平方公尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。 <u>適用於</u> <u>婆羅門參</u> <u>葉。</u>	本 項 修 正。
蒜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。 <u>適用於</u> 蒜葉。	
蔥	苗立枯 病	2 公克/ 平方公尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
韭	苗立枯 病	2 公克/ 平方公尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
路蕎	苗立枯 病	2 公克/ 平方公尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。 <u>適用於</u> 路蕎葉。	
珠蔥	苗立枯 病	2 公克/ 平方公尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。 <u>適用於</u> 珠蔥葉。	
芹菜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
芫荽	苗立枯 病	2 公克/ 平方公	1,500	播種後均 勻澆淋稀					僅限苗期使 用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		尺		釋液 1 次。						
茴香	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
山芹菜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
菠菜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
甜菜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。適用於 葉用甜菜。	
莧菜	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
瓜菜類	立枯病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	瓜類育苗 期：瓜類 種子播種 後，立即 於穴盤上 均勻澆淋 稀釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
瓜菜類	立枯病	100 毫 升/株	1,500	瓜類移植 期：瓜類 瓜苗定植 後，於移 植穴立即 澆灌稀釋 液 1 次。					僅限苗期使 用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
瓜果類	立枯病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	瓜類育苗 期：瓜類 種子播種 後，立即 於穴盤上 均勻澆淋 稀釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	
瓜果類	立枯病	100 毫 升/株	1,500	瓜類移植 期：瓜類 瓜苗定植 後，於移 植穴立即 澆灌稀釋 液 1 次。					僅限苗期使 用。	
艾草	苗立枯 病	2 公克/ 平方公 尺	1,500	播種後均 勻澆淋稀 釋液 1 次。					僅限苗期使 用。	