

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

## 「鮎澤蘇力菌 NB-200」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

54% (15,000 IU/mg) 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑 (WG)

| 作物名稱  | 病蟲名稱  | 每公頃每次用量      | 稀釋倍數  | 使用時期       | 施藥間隔(天) | 施藥次數   | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                         | 說明          |
|-------|-------|--------------|-------|------------|---------|--------|------|----------|------------------------------|-------------|
| 蔬菜    | 鱗翅目害蟲 | 0.5-2.0 公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |                              |             |
| 番茄    | 夜蛾類   | 0.5-1.0 公斤   | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |        |      |          |                              |             |
| 果樹    | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |                              |             |
| 鳳梨    | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤   | 1,000 | 開花末期開始施藥。  | 7       | 連續 3 次 |      |          |                              |             |
| 葡萄    | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |                              |             |
| 山茶科茶類 | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1 公斤     | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 |         |        |      |          |                              |             |
| 愛玉子   | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |                              |             |
| 檳榔    | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |                              |             |
| 咖啡    | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |                              |             |
| 破布子   | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |                              |             |
| 可可    | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |                              |             |
| 蛇麻    | 鱗翅目害蟲 | 0.5 - 1.5 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 3 次  |      |          | 本藥劑試驗時添加農皂作為展著劑(稀釋 3,000 倍)。 | 本項新增。(公務預算) |