

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「得恩地」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
80% 得恩地 水分散性粒劑	高事達農化有限公司	○年○月○日	本藥劑係 80%得恩地可溼性粉劑轉換為更安全劑型

二、「得恩地」農藥使用方法與範圍一覽表

40(%) (w/w) 得恩地 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
檬果	炭疽病	4-5 公升	500	開花初期開始施藥。	7			30	最後一次施藥後，藥液乾後即套袋。	

65(%) (w/w) 得恩地 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葡萄	晚腐病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
楊桃	炭疽病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
蓮霧	炭疽病	1.7-5.0 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
番石榴	炭疽病	2.0-3.3 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
無花果	炭疽病	1.3-2.7 公斤	600	謝花幼果期施藥。	7			15		
桃	縮葉病		160	病害發生初期開始施藥。					使用時加展著劑	
鐘麻	腰折病	17-18 公斤	1,000	播種前施藥。						

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

80(%) (w/w) 得恩地 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
草莓	灰黴病	2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
葡萄	晚腐病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
楊桃	炭疽病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
蓮霧	炭疽病	1.3-3.8 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
番石榴	炭疽病	1.5-2.5 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
無花果	炭疽病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
檬果	炭疽病		800	開花初期施藥。				30	1. 開花初期開始施藥，以後每隔7天施藥1次，連續4次。 2. 結果後每隔14天施藥1次，至套袋為止。	
桃	縮葉病		200	病害發生初期開始施藥。					使用時加展著劑。	
鐘麻	腰折病		1,200	病害發生初期開始施藥。						
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥1次。			確定藥劑密布全株。		施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
輸入植物檢疫物	檢疫處理								依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									之規定處理。	
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。			確定藥劑密布全株。		施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
蔬菜	種子檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

80%(w/w) 得恩地 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
草莓	灰黴病	2 公斤	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		15		變更安全劑型
葡萄	晚腐病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
楊桃	炭疽病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
蓮霧	炭疽病	1.3-3.8 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
番石榴	炭疽病	1.5-2.5 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
無花果	炭疽病	1-2 公斤	800	謝花幼果期施藥。	7			15		
檬果	炭疽病		800	開花初期施藥。				30	1. 開花初期開始施藥，以後每隔 7 天施藥 1 次，連續 4 次。 2. 結果後每隔 14 天施藥 1 次，至套袋為止。	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
桃	縮葉病		200	病害發生 初期開始 施藥。					使用時加展著 劑。	
鐘麻	腰折病		1,200	病害發生 初期開始 施藥。						
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。			確定藥 劑密布 全株。		施藥量及稀釋 倍數依輸入國 之規定處理。	
輸入植 物檢疫 物	檢疫處 理								依「輸入植物 檢疫物檢疫處 理消毒方法」 之規定處理。	
觀賞植 物	苗檢疫 處理			檢疫處理 時施藥 1 次。			確定藥 劑密布 全株。		施藥量及稀釋 倍數依輸入國 之規定處理。	
蔬菜	種子檢 疫處理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀釋 倍數依輸入國 之規定處理。	