

「鮎澤蘇力菌 ABTS-1857」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 10 月 27 日農授防字第 1141878545B 號公告修正

10.8% (7,000 DBMU/mg) 鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
甘藍	小菜蛾	0.8-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					

48.1% (35,000 DBMU/mg) 鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
茶	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。					適用於茶 籽。	
油茶	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
十字花 科包葉 菜類	鱗翅目 害蟲	1-1.2 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
甘藍	小菜蛾	0.25-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				本劑試驗時 加著劑自然 油 1,500 倍。	
豆科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
十字花 科小葉 菜類	鱗翅目 害蟲	1-1.2 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
茄科小 葉菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
蔥	夜蛾類	1-1.5 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
菠菜	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
豆科根 菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
十字花 科根菜 類	鱗翅目 害蟲	1-1.2 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
茄科根 菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
胡蘿蔔	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
茄科果 菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
豆菜類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
草莓	夜蛾類	0.8-1.0 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
菊	夜蛾類	0.1-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
野薑	夜蛾類	0.3-0.6 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					
蓮	夜蛾類	0.3-0.5 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7					

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
山茶	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
茶	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。						
蛇麻	鱗翅目 害蟲	0.5 - 1.5 公斤	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	共 3 次			本藥劑試驗 時添加農皂 作為展著劑 (稀釋 3,000 倍)。	本項新增。(主管 機關依據農藥 管理法第11條 以公務預算辦 理之田間試驗)