

「鮎澤蘇力菌 NB-200」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 10 月 27 日農授防字第 1141878545C 號公告修正

54% (15,000 IU/mg) 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑 (WG)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事 項	說明
蔬菜	鱗翅目 害蟲	0.5-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
番茄	夜蛾類	0.5-1.0 公斤	1,500	害蟲發生時 開始施藥。	7					
果樹	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
鳳梨	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	開花末期開 始施藥。	7	連續 3 次				
葡萄	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
山茶科 茶類	鱗翅目 害蟲	0.8-1 公 斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。						
愛玉子	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
檳榔	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
咖啡	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
破布子	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
可可	鱗翅目 害蟲	1.0-2.0 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 2 次				
蛇麻	鱗翅目 害蟲	0.5 - 1.5 公斤	1,000	害蟲發生時 開始施藥。	7	共 3 次			本藥劑 試驗時 添加農 皂作為 展著劑 (稀釋 3,000 倍)。	本項新 增。(主管 機關依據 農藥管理 法第11條 以公務預 算辦理之 田間試驗)