

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「特酮草氟胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年○月○日農授防字第○號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱 | 英文普通名稱 | IUPAC/有效成分 |
|-------|----------------------------|--|
| 特酮草氟胺 | tefuryltrione + triafamone | (1) 特酮草 tefuryltrione : 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3- ({(2RS)-tetrahydro-2- furyl]methoxy}methyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (2) 草氟胺 triafamone : 2'-[(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2- yl)carbonyl]-1,1,6'-trifluoro-N-methylmethanesulfonanilide |

二、「特酮草氟胺」農藥使用方法與範圍一覽表

11.6%(w/v) 特酮草氟胺 粒劑(GR)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|---------|------|---|---------|------|------|----------|---|--|
| 水稻 | 雜草 | 1.2 公斤 | | 插秧後 3~7 日，雜草 0-3 葉期施用，田區保持水深 3-5 公分，均勻撒於水田 1 次，施藥後保持積水 5-7 天。 | | | | | 1. 防除水稻水田雜草。 2. 防除對象：稗草、雙穗雀稗、芒稷、螢蘭及鴨舌草等。 | 原始登商 記廠商 名稱：台 灣拜耳 股份有 限公司 |