

# 「特酮草氟胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 11 月 28 日農授防字第 1141878745B 號公告

## 一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
特酮草氟胺	tefuryltrione + triafamone	(1) 特酮草 tefuryltrione : 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3- ({(2RS)-tetrahydro-2- furyl]methoxy}methyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (2) 草氟胺 triafamone : 2'-[(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2- yl)carbonyl]-1,1,6'-trifluoro-N-methylmethanesulfonanilide

## 二、「特酮草氟胺」農藥使用方法與範圍一覽表

11.6%(w/v) 特酮草氟胺 粒劑(GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	1.2 公斤		插秧後 3~7 日，雜草 0-3 葉期施用，田區保持水深 3-5 公分，均勻撒於水田 1 次，施藥後保持積水 5-7 天。					1. 防除水稻水田雜草。 2. 防除對象：稗草、雙穗雀稗、芒稷、螢蘭及鴨舌草等。	原始登 記廠商 名稱：台 灣拜耳 股份有 限公司