

「曼普歐西比」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 11 月 28 日農授防字第 1141878745D 號公告修正

280 g/L (28% w/v) 曼普歐西比 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7-10	共 2 次		7		
十字花科小葉菜類	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
不結球萵苣與半結球萵苣	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
茼蒿	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
山茼蒿	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
紅鳳菜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
白鳳菜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
芳香萬壽菊	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
闊包菊	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
蒜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
蔥	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始	7	共 2 次		3		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
韭	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
蔞蕎	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
珠蔥	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
龍鬚菜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
羅勒	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
菠菜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
蘿蔔	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		
蕪菁	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		
山葵	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		
番茄	疫病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
番茄	晚疫病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		
胡瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
苦瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
絲瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
冬瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
南瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
扁蒲	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
隼人瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
越瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
夏南瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
木鱨果	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
木瓜	果疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		
葡萄	露菌病	0.67 公升	1,800	病害發生初期開始施藥。	7-10	共 2 次		21		
蓮霧	疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		
番石榴	疫病	0.4 公升	5,000	病害發生	7	共 3 次		14		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				初期開始施藥。						
無花果	疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		
甜椒、 辣椒、 茄子、 枸杞、 香瓜 茄、樹 番茄	疫病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		本項新增。
洋蔥 落蔞 蒜 珠蔥 薑 甘藷	疫病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14	適用於落蔞頭。 適用於蒜頭。 適用於紅蔥頭 適用於甘藷塊根。	本項新增。