

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「乙基三奈素」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
乙基三奈素	Trinexapac-ethyl	Ethyl (1RS,4EZ)-4-[cyclopropyl(hydroxy)methylene]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate

二、「乙基三奈素」農藥使用方法與範圍一覽表

116.4 g/L(11.64 %w/v)乙基三奈素 溶液(SL)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
百慕達草	生長調節	0.2 公升	加水稀釋至 300 公升	草皮修剪後(高度 0.2-0.5 公分以下),每隔 7-14 天施藥 1 次,如生長旺盛期或恢復期,可以每週施藥 1 次,連續 3 次。					1. 限於高爾夫球場百慕達草草皮或百慕達草苗圃使用。 2. 避免於修剪前後 6 個小時內施藥,以免造成暫時性黃化。 3. 每年每公頃最大施用總量為 10.4 公升。	原始登 記廠商 名稱： 台灣先 正達股 份有限 公司