

「益達胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 3 月 20 日農授防字第 1151875426E 號公告修正

2(%) (w/w) 益達胺 粒劑 (GR)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	水象鼻 蟲	50 克/育 苗 箱 (60x30x 4 公分)		機械插秧 前 24 小 時。					限育苗箱秧 苗使用。藥 灑於育苗箱 後要灑水， 本田應注意 灌水，勿讓 土面曝露以 免發生藥 害。	
十字花 科包葉 菜類	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植後於畦 上施藥 1 次。						
菊科包 葉菜類	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植於畦上 施藥 1 次。						
旋花科 小葉菜 類	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植於畦上 施藥 1 次。						
豌豆	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 複葉展 開時，於 畦上施藥 1 次。						
十字花	粉蟲類	60 公斤		播種後第						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
科小葉 菜類				1 真葉展 開時或定 植後於畦 上施藥 1 次。						
菊 科 小 葉菜類	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植於畦上 施 藥 1 次。						
枸杞	粉蟲類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次。					適用於枸杞 葉。	
龍鬚菜	粉蟲類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次。						
菠菜	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時，於 畦上施藥 1 次。						
旋 花 科 根菜類	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植於畦上 施 藥 1 次。						
豆 科 根 菜類	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 複葉展 開時，於 畦上施藥 1 次。						
十 字 花 科 根 菜 類	粉蟲類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植後於畦						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				上施藥 1 次。						
菊 科 根 菜類	粉蝨類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植於畦上 施 藥 1 次。						
馬鈴薯	粉蝨類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次。						
茄 科 果 菜類	粉蝨類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次。						
秋葵	粉蝨類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次。						
<u>冬瓜</u> <u>南瓜</u> <u>胡瓜</u> <u>苦瓜</u> <u>夏南瓜</u> <u>隼人瓜</u> <u>絲瓜</u> <u>越瓜</u> <u>扁蒲</u> <u>木鼈果</u>	粉蝨類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次。						本 項 修 正。
豆菜類	粉蝨類	60 公斤		播種後第 1 複葉展 開時，於 畦上施藥 1 次。						
瓜果類	粉蝨類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次。						
刺桐屬 植物	刺桐釉 小蜂	每 株 250 公							1. 於樹幹 基部周	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		克							邊 1 公 尺內， 向下挖 15 公 分深溝 槽。 2. 將藥劑 均勻埋 入溝槽 內。 3. 限使用 於胸徑 30 公 分以下 之 植 株。 4. 施藥後 需充份 澆水， 梅雨季 施用效 果 最 佳。	
菊	粉蝨類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植於畦上 施 藥 1 次。						
洋甘菊	粉蝨類	60 公斤		播種後第 1 真葉展 開時或定 植於畦上 施 藥 1 次。						
桉屬植 物	桉樹枝 瘿 紬 小	10 公克					苗高 1 公 尺以下，			

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	蜂						每株埋入10公克藥劑於苗木根部土下3公分部位，必要時隔1個月再施藥一次。			
黃耆	粉蝨類	60 公斤		播種後第1複葉展開時，於畦上施藥1次。						
風茹	粉蝨類	60 公斤		播種後第1真葉展開時或定植於畦上施藥1次。						
艾草	粉蝨類	60 公斤		播種後第1真葉展開時或定植於畦上施藥1次。						

0.03(%) (w/w) 益達胺 餌劑 (RB)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
作物園	紅火蟻	2 公斤 (大面積處理)					大面積處理時，於火蟻覓食區利用撒佈器均勻撒佈。		1. 餌劑應儘早使用。 2. 春秋季之早晨或傍晚(冬季上午 10 時至下午 3 時)地表溫度 21°C 至 38°C 時，施用在入侵火蟻活動覓食區。 3. 施用餌劑時地表須乾燥，若施用後 12 小時內下雨應重新施藥，且餌劑施放後 24 小時內勿灌溉。 4. 禁止將餌劑與其他物質如肥料等混合使用。	
作物園	紅火蟻	25 公克/平方公尺蟻塚 (獨立蟻丘處理)					獨立蟻丘處理沿蟻丘周圍 1 公尺內撒佈。		1. 餌劑應儘早使用。 2. 春秋季之早晨或傍晚(冬季上午 10 時至下午 3 時)地表溫度 21°C 至 38°C 時，施用在入侵火蟻活動覓食區。 3. 施用餌劑時地表須乾燥，若施用後 12 小時內下雨應重新施藥，且餌劑施放後 24 小時內勿灌溉。 4. 禁止將餌劑與其他物質如肥料等混合使用。	

18.2(%) (w/w) 益達胺 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蟲	0.2 公升	6,000	5 隻/叢, 施 1 次。				10	其後 20 隻/叢, 施第二次, 特別注意孕穗期至抽穗初期之防除。	
水稻	斑飛蟲	0.4 公升	3,000	抽穗後。				10		
茶	葉蟬類	0.2-0.5 公升	6,000	發芽初期 害蟲發生時開始施藥。	7			12	適用於茶籽。	
油茶	葉蟬類	0.2-0.5 公升	6,000	發芽初期 害蟲發生時開始施藥。	7			12		
胡麻	葉部 薊馬類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免施用於弱勢苗。	
十字花科包葉菜類	粉蟲類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
十字花科包葉菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用, 避免施用於弱勢苗, 以免發生藥害。	
十字花科包葉菜類	偽菜蚜	0.1-0.15 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
花椰菜	銀葉粉蟲	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。		2		9		與大類範圍重疊, 本項刪除。
菊科包葉菜類	粉蟲類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科包	蚜蟲類	0.03-0.1	8,000	害蟲發生	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
葉菜類		公升		時開始施藥。						
菊科包 葉菜類	薊馬類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
菊科包 葉菜類	葉部 薊 馬類	0.05- 0.25 公 升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
旋花科 小葉菜 類	粉蝨類	0.1-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
旋花科 小葉菜 類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗， 以免發生藥 害。	
蘿菜	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
甘藷	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	限用於葉用 甘藷。	與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
豆科小 葉菜類	葉部 薊 馬類	0.15-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豌豆	粉蝨類	0.2-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
十字花 科小葉 菜類	粉蝨類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
十字花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗，	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									以免發生藥害。	
十字花 科小葉 菜類	偽菜蚜	0.1-0.15 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
芥藍	銀葉粉 蝨	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
菊科小 葉菜類	粉蝨類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菊科小 葉菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗， 以免發生藥 害。	
菊科小 葉菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		重複範 圍，本項 刪除。
菊科小 葉菜類	薊馬類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
菊科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.05- 0.25公 升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茄科小 葉菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗， 以免發生藥 害。	
茄科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.15-0.5 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
枸杞	粉蝨類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施	7			9	適用於枸杞 葉。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
蔥科小 葉菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗， 以免發生藥 害。	
蔥科小 葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.15 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		重 複 範 圍，本項 刪除。
蔥科小 葉菜類	薊馬類	0.2-0.5 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免施用於 弱勢苗，以免 發生藥害。	
蔥科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.25- 0.38 公 升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		與 大 類 範 圍 重 疊，本項 刪除。
葫蘆科 小葉菜 類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗， 以免發生藥 害。	
龍鬚菜	粉蟲類	0.3-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				採收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停止用 藥。	
繖形花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗， 以免發生藥 害。	
芹菜	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與 大 類 範 圍 重 疊，本項 刪除。
唇形花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗，	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									以免發生藥害。	
羅勒	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
藜科小 葉菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗， 以免發生藥 害。	
菠菜	粉蝨類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菠菜	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茭白筍	長綠飛 蟲	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		21		
竹	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
旋花科 根菜類	粉蝨類	0.1-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科根 菜類	粉蝨類	0.2-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科根 菜類	葉部薊 馬類	0.15-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
山藥	葉部薊 馬類	0.25- 0.38 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花	粉蝨類	0.1-0.3	3,000	害蟲發生	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
科根菜類		公升		時開始施藥。						
十字花科根菜類	偽菜蚜	0.1-0.15 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	粉蝨類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	薊馬類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	葉部薊馬類	0.05-0.25 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
牛蒡	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		與大類範圍重疊，本項刪除。
茄科根菜類	葉部薊馬類	0.15-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
馬鈴薯	粉蝨類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蔥科根菜類	蚜蟲類	0.1-0.15 公升	8,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蔥科根菜類	薊馬類	0.2-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
蔥科根菜類	葉部薊馬類	0.25-0.38 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
										刪除。
芋	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
茄科果 菜類	粉蝨類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄科果 菜類	葉部 薊 馬類	0.15-0.5 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	南黃薊 馬	0.25- 0.38 公 升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。				6		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
金針	蚜蟲類	0.1-0.15 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
洛神葵	蚜蟲類	0.15-0.3 公升	4,000	蚜蟲發生 初期全株 施藥 1 次。				6	注意藥液需 噴及新梢處。	
秋葵	粉蝨類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
秋葵	葉部 薊 馬類	0.15-0.5 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
<u>冬瓜</u> <u>南瓜</u> <u>胡瓜</u> <u>苦瓜</u> <u>夏南瓜</u> <u>隼人瓜</u> <u>絲瓜</u> <u>越瓜</u> <u>扁蒲</u> <u>木鼈果</u>	粉蝨類	0.3-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				採收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停止用 藥。	本項修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
瓜菜類	粉蟲類	0.3-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		重 複 範 圍，本項 刪除。
冬瓜 南瓜 胡瓜 苦瓜 夏南瓜 隼人瓜 絲瓜 越瓜 扁蒲 木鼈果	葉部 薊 馬類	0.3-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本 項 修 正。
胡瓜	南黃薊 馬	0.25- 0.38 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與 大 類 範 圍 重 疊，本項 刪除。
苦瓜	蚜蟲類	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時施藥 1 次。	7				採收前 9 天 停止施藥。栽 培於設施內 之作物採收 前 15 天停止 施藥。	
冬瓜	銀葉粉 蟲	0.3-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與 大 類 範 圍 重 疊，本項 刪除。
豆菜類	粉蟲類	0.03-0.1 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免施 用於弱勢苗， 以免發生藥 害。	
豆菜類	葉部 薊 馬類	0.25- 0.38 公 升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆菜類	葉部 薊 馬類	0.15-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施	7			9		重 複 範 圍，本項

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						刪除。
大豆	銀葉粉 蝨	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	限毛豆使用。	與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
瓜果類	粉蝨類	0.3-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
瓜果類	銀葉粉 蝨	0.3-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
瓜果類	薊馬類	0.25- 0.38 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
瓜果類	葉部薊 馬類	0.3-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
瓜果類	南黃薊 馬	0.25- 0.38 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
香蕉	薊馬類	0.75-1.0 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
木瓜	蚜蟲類	0.1-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				6		
番荔枝	薊馬類	0.75-1.0 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
番荔枝	小黃薊 馬	0.25- 0.38 公 升	3,000	害蟲於幼 嫩心葉發 生時開始 施藥。	7	3-4		12	施藥時應噴 及幼嫩心葉。	與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
酪梨	薊馬類	0.75-1.0	2,000	害蟲發生	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
草莓	葉部 薊馬類	0.25-0.38 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限開花前使用。	
楊桃	薊馬類	0.2-0.4 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蓮霧	葉蟬類	0.15-0.5 公升	6,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9		
蓮霧	薊馬類	0.3-0.75 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蓮霧	腹鈎 薊馬	0.25-0.38 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	14	1-2		9		與大類範圍重疊，本項刪除。
蓮霧	米爾頓絨小蜂	0.25-0.38	4,000	花謝後開始施藥至套袋前。	14			9	避免於開花期施藥。	
番石榴	葉蟬類	0.2-0.35 公升	6,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9	避免施用於生長勢弱之幼苗，以免發生藥害。	
番石榴	薊馬類	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
桑樹	桑木蝨	0.25-0.55 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
檬果	綠葉蟬	0.25-0.35 公升	6,000	抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。	10			9		
檬果	檬果木蝨	0.3-0.65 公升	3,000	害蟲發生時開始施	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥。						
檬果	薊馬類	0.75-1.0 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
<u>梨</u> <u>蘋果</u> <u>桃</u> <u>梅</u> <u>李</u> <u>杏</u> <u>枇杷</u>	薊馬類	0.15- 0.63 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本 項 修 正。
梨	柑桔捲 葉蚜	0.25-0.4 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。				9		
梨	梨木蝨	0.8 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
蘋果	蚜蟲類	0.15-0.2 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
桃	蚜蟲類	0.15- 0.35 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
梅	蚜蟲類	0.2-0.3 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
李	蚜蟲類	0.15- 0.35 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
枇杷	蚜蟲類	0.25- 0.35 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
<u>棗</u> <u>印度棗</u>	蚜蟲類	0.15-0.2 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		本 項 修 正。
<u>棗</u> <u>印度棗</u>	薊馬類	0.15- 0.63 公	3,000	害蟲發生 時開始施	7			9		本 項 修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		升		藥。						
柿	夜蛾類	0.38-0.5 公升	3,000	於幼果期 施藥	7			9		
柿	薊馬類	0.15- 0.63 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
柑桔類	薊馬類	0.3-0.8 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	勿用於花期。	
花木	粉蝨類	0.2-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用前 宜先進行小 面積藥害測 試。	
刺桐屬 植物	刺桐紬 小蜂								1. 每公頃 每次用 藥量：植 株胸徑 小於 20 公分者， 施用 10 毫升；胸 徑每增 加 10 公 分，則增 加 5 毫 升（1 處）。 2. 於樹幹 胸高處 （約 130 公 分）以電 鑽鑽直 徑 1 公 分深度 10 公分	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									的孔洞 (與樹 幹角 度約 為45 度), 每 一 孔 洞 注 入 5 毫 升 藥 劑。 3. 藥劑 注 射 完 成 後, 以 中 性 矽 利 康 膠 塗 佈 孔 洞 表 面 封 口, 以 避 免 藥 劑 蒸 散。 4. 電 鑽 頭 及 針 頭 需 以 75% 酒 精 消 毒 後 使 用 5. 孔 洞 盡 量 均 勻 分 布 於 樹 幹, 避 免 施 作 於 一 處。	
菊	夜蛾類	0.1-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	粉蝨類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
菊	蚜蟲類	0.04-0.2 公升	7,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	薊馬類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	薊馬類	0.1-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥	7			12		重 複 範 圍，本項 刪除。
洋甘菊	粉蝨類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
野薑	夜蛾類	0.35- 0.85 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	限開花前使 用。	
百合	蚜蟲類	0.15-0.3 公升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10			6	限食用花苞 品種使用。	
百合	薊馬類	0.25- 0.38 公 升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。				6		
蓮	夜蛾類	0.4-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	施藥時應噴 及葉背。	
蓮	蚜蟲類	0.15- 0.25 公 升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10			12	限開花前使 用。	
蓮	葉部薊 馬類	0.25- 0.38 公 升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	禁止使用於 蓮子。	
蓮	小黃薊 馬	0.4-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	施藥時應噴 及葉背。	
玫瑰	蚜蟲類	0.13 公 升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10			12		
玫瑰	薊馬類	0.35-	3,000	害蟲發生	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		0.85 公 升		時開始施 藥。						
臺灣樂 樹	椿象類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				避免於開花 期使用。	
山茶	葉蟬類	0.2-0.5 公升	6,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7					
睡蓮	薊馬類	0.4-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				12	避免於開花 期使用。	
茶	柑桔刺 粉蟲	0.25 公 升	4,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				12		
茶	葉蟬類	0.2-0.5 公升	6,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	適用於茶葉。	
茶	小綠葉 蟬	0.18 公 升	6,000	萌芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。				12		
茶	小黃薊 馬	0.25 公 升	4,000	萌芽初 期, 害蟲 發生時開 始施藥。				12		
黃耆	粉蟲類	0.2-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	粉蟲類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	蚜蟲類	0.03- 0.13 公 升	8,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	薊馬類	0.1-0.3	3,000	害蟲發生	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。						
艾草	粉蟲類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
亞洲棕 櫚	象鼻蟲 類	1-1.5 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。					藥劑由葉芽, 葉腋等處灌 注整叢植株 內,每十天一 次連續兩次。	
可可	蚜蟲類	0.2-0.5 公升	4,000	蚜蟲發生 時施藥 1 次。				14	提高施用濃 度,可能引起 藥害發生。	
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	

9.6(%) (w/w) 益達胺 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蟲	0.4 公升	3,000	5 隻/叢, 施 1 次。				10	其後 20 隻/叢, 施第二次, 特別注意孕穗期至抽穗初期之防除。	
水稻	斑飛蟲	0.75 公升	1,600	抽穗後。				10		
茶	葉蟬類	0.3-1.0 公升	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥。	7			12	適用於茶籽。	
油茶	葉蟬類	0.3-1.0 公升	3,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥。	7			12		
胡麻	葉部薊馬類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免施用於弱勢苗。	
十字花科包葉菜類	粉蟲類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
十字花科包葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用, 避免施用於弱勢苗, 以免發生藥害。	
十字花科包葉菜類	偽菜蚜	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊, 本項刪除。
花椰菜	銀葉粉蟲	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。		2		9		與大類範圍重疊, 本項刪除。
菊科包	粉蟲類	0.2-0.7	1,500	害蟲發生	7			9		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葉菜類		公升		時開始施藥。						
菊科包葉菜類	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科包葉菜類	薊馬類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
菊科包葉菜類	葉部薊馬類	0.1-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
旋花科小葉菜類	粉蟲類	0.2-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
旋花科小葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
薤菜	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
甘藷	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	限用於葉用甘藷	與大類範圍重疊，本項刪除。
豆科小葉菜類	葉部薊馬類	0.3-0.4公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
豌豆	粉蟲類	0.3-0.5公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
十字花科小葉菜類	粉蟲類	0.2-0.7	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
十字花 科小葉 菜類	偽菜蚜	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
芥藍	銀葉粉 蝨	0.6-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
菊科小 葉菜類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菊科小 葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
菊科小 葉菜類	薊馬類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
菊科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.1-0.5 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茄科小 葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
茄科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.3-1公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
枸杞	粉蝨類	0.3-1公	1,500	害蟲發生	7			9	適用於枸杞	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		升		時開始施 藥。					葉。	
蔥科小 葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
蔥科小 葉菜類	薊馬類	0.4-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免施用於 弱勢苗，以 免發生藥 害。	
蔥科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
葫蘆科 小葉菜 類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
龍鬚菜	粉蟲類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7				9天(設施栽 培15天)	
繖形花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
芹菜	蚜蟲類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
唇形花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
羅勒	蚜蟲類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
藜科小 葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
菠菜	粉蝨類	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菠菜	蚜蟲類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茭白筍	長綠飛 蟲	0.8-1.0 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		21		
竹	蚜蟲類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
旋花科 根菜類	粉蝨類	0.2-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科根 菜類	粉蝨類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科根 菜類	葉部薊 馬類	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
山藥	葉部薊 馬類	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科根菜 類	粉蝨類	0.2-0.7	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科根菜類	偽菜蚜	0.2-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	粉蝨類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	薊馬類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	葉部薊馬類	0.1-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		與大類範圍重疊，本項刪除。
牛蒡	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
茄科根菜類	葉部薊馬類	0.3-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
馬鈴薯	粉蝨類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蔥科根菜類	蚜蟲類	0.2-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蔥科根菜類	薊馬類	0.4-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
蔥科根菜類	葉部薊馬類	0.5-0.75公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		與大類範圍重疊，本項刪除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
芋	蚜蟲類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
茄科果 菜類	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄科果 菜類	葉部 薊 馬類	0.3-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
茄子	南黃薊 馬	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。				6		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
金針	蚜蟲類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
洛神葵	蚜蟲類	0.3-0.6 公升	2,000	蚜蟲發生 初期全株 施藥 1 次。				6	注意藥液需 噴及新梢 處。	
秋葵	粉蝨類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
秋葵	葉部 薊 馬類	0.3-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
<u>冬瓜</u> <u>南瓜</u> <u>胡瓜</u> <u>苦瓜</u> <u>夏南瓜</u> <u>隼人瓜</u> <u>絲瓜</u> <u>越瓜</u> <u>扁蒲</u> <u>木鼈果</u>	粉蝨類	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		本項修 正。
<u>冬瓜</u>	葉部 薊	0.6-1.2	1,500	害蟲發生	7			6		本項修

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
南瓜 胡瓜 苦瓜 夏南瓜 隼人瓜 絲瓜 越瓜 扁蒲 木鼈果	馬類	公升		時開始施藥。						正。
胡瓜	南黃薊馬	0.5-0.75公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		與大類範圍重疊，本項刪除。
冬瓜	銀葉粉蝨	0.6-1.2公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		與大類範圍重疊，本項刪除。
豆菜類	粉蝨類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		重複範圍，本項刪除。
豆菜類	粉蝨類	0.1-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
豆菜類	葉部薊馬類	0.5-0.75公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		重複範圍，本項刪除。
豆菜類	葉部薊馬類	0.3-0.4公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		本項修正
大豆	銀葉粉蝨	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9	限毛豆使用。	與大類範圍重疊，本項刪除。
瓜果類	粉蝨類	0.6-1.2公升	1,500	害蟲發生時開始施	7			21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
瓜果類	銀葉粉 蝨	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
瓜果類	薊馬類	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
瓜果類	葉部薊 馬類	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
瓜果類	南黃薊 馬	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
香蕉	薊馬類	0.2-0.6 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
木瓜	蚜蟲類	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				6		
番荔枝	薊馬類	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
番荔枝	小黃薊 馬	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲於幼 嫩心葉發 生時開始 施藥。	7	3-4		9	施藥時應噴 及幼嫩心 葉。	與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
酪梨	薊馬類	1.5-2.0 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
草莓	葉部薊 馬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限開花前使 用。	
楊桃	薊馬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
蓮霧	葉蟬類	0.3-1 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9		
蓮霧	薊馬類	0.6-1.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蓮霧	腹鉤薊馬	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14	2		9		與大類範圍重疊，本項刪除。
蓮霧	米爾頓絨小蜂	0.5-0.75 公升	2,000	花謝後開始施藥至套袋前。	14			9	避免於開花期施藥。	
番石榴	葉蟬類	0.4-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9	避免施用於生長勢弱之幼苗，以免發生藥害。	
番石榴	薊馬類	0.6-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
桑樹	桑木蝨	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
檬果	綠葉蟬	0.5-0.7 公升	3,000	抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。	10			6		
檬果	檬果木蝨	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
檬果	薊馬類	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
梨 蘋果 桃	薊馬類	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		本項修正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
梅 李 杏 枇杷										
梨	柑桔捲 葉蚜	0.5-0.8 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。				6		
梨	梨木蝨	1.6 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
蘋果	蚜蟲類	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
桃	蚜蟲類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
梅	蚜蟲類	0.4-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
李	蚜蟲類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
枇杷	蚜蟲類	0.5-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
棗 印度棗	蚜蟲類	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		本 項 修 正。
印度棗	薊馬類	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本 項 修 正。
棗	薊馬類	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本 項 修 正。
柿	夜蛾類	0.75-1.0 公升	1,500	於幼果期 施藥。	7			12		
柿	薊馬類	0.3-1.25	1,500	害蟲發生	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。						
柑桔類	薊馬類	0.7-1.6 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	勿用於花 期。	
花木	粉蝨類	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
刺桐屬 植物	刺桐紬 小蜂								1. 每公頃 每次用 藥量： 植株胸 徑小於 20 公 分者， 施 用 10 毫 升；胸 徑每增 加 10 公分， 則增加 5 毫升 (1 處)。 2. 於樹幹 胸高處 (約 130 公 分) 以 電鑽鑽 直徑 1 公分深 度 10 公分的	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									孔洞 (與樹 幹角度 約為 45 度),每 一孔洞 注入 5 毫升藥 劑。 3. 藥劑注 射完成 後,以 中性矽 利康膠 塗佈孔 洞表面 封口, 以避免 藥劑蒸 散。 4. 電鑽頭 及針頭 需以 75% 酒 精消毒 後使用。 5. 孔洞盡 量均勻 分布於 樹幹, 避免施 作於一 處。	
菊	夜蛾類	0.2-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
菊	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	蚜蟲類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	薊馬類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
洋甘菊	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
野薑	夜蛾類	0.7-1.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	限開花前使 用。	
百合	蚜蟲類	0.3-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10			6	限食用花苞 品種使用。	
百合	薊馬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。				6		
蓮	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	施藥時應噴 及葉背。	
蓮	蚜蟲類	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	限開花前使 用。	
蓮	葉部薊 馬類	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	禁止使用於 蓮子。	
蓮	小黃薊 馬	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	施藥時應噴 及葉背。	
玫瑰	蚜蟲類	0.25 公 升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10					

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
玫瑰	薊馬類	0.7-1.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
臺灣樂 樹	椿象類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				避免於開花 期使用。	
山茶	葉蟬類	0.3-1.0 公升	3,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7					
睡蓮	薊馬類	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時施藥 1 次。				12	避免於開花 期使用。	
茶	柑桔刺 粉蟲	0.5 公升	2,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				12		
茶	葉蟬類	0.3-1.0 公升	3,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	適用於茶 葉。	
茶	小綠葉 蟬	0.35 公 升	3,000	萌芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。				12		
茶	小黃薊 馬	0.5 公升	2,000	萌芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。				12		
黃耆	粉蟲類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	粉蟲類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
風茹	薊馬類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
艾草	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
亞洲棕 櫚	象鼻蟲 類	2-3 公 升	500	害蟲發生 時開始施 藥。					藥劑由葉 芽,葉腋等 處灌注整叢 植株內,每 十天一次連 續兩次;加 展著劑「嘉 農 90」3,000 倍。	
可可	蚜蟲類	0.5-1 公 升	2,000	蚜蟲發生 時施藥 1 次。				14	提高施用濃 度,可能引 起藥害發 生。	
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	

28.8(%) (w/w) 益達胺 溶液 (SL)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蟲	0.13 公升	9,000	5 隻/叢, 施 1 次。				10	其後 20 隻/叢, 施第二次, 特別注意孕穗期至抽穗初期之防除	
水稻	斑飛蟲	0.25 公升	4,800	抽穗後。				10		
茶	葉蟬類	0.1-0.3 公升	9,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥。	7			12	適用於茶籽。	
油茶	葉蟬類	0.1-0.3 公升	9,000	發芽初期害蟲發生時開始施藥。	7			12		
胡麻	葉部薊馬類	0.1-0.2 公升	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免施用於弱勢苗。	
十字花科包葉菜類	粉蟲類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
十字花科包葉菜類	蚜蟲類	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用, 避免施用於弱勢苗, 以免發生藥害。	
十字花科包葉菜類	偽菜蚜	0.07-0.1 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊, 本項刪除。
花椰菜	銀葉粉蟲	0.2-0.27 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。		2		9		與大類範圍重疊, 本項刪除。
菊科包	粉蟲類	0.1-0.2	4,500	害蟲發生	7			9		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葉菜類		公升		時開始施藥。						
菊科包葉菜類	蚜蟲類	0.02-0.07 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科包葉菜類	薊馬類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
菊科包葉菜類	葉部薊馬類	0.03-0.17 公升	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
旋花科小葉菜類	粉蟲類	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
旋花科小葉菜類	蚜蟲類	0.02-0.08 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
薤菜	蚜蟲類	0.02-0.07 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
甘藷	蚜蟲類	0.02-0.07 公升	12,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	限用於葉用甘藷。	與大類範圍重疊，本項刪除。
豆科小葉菜類	葉部薊馬類	0.10-0.13 公升	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
豌豆	粉蟲類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
十字花科小葉菜類	粉蟲類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
十字花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
十字花 科小葉 菜類	偽菜蚜	0.07-0.1 公升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
芥藍	銀葉粉 蝨	0.2-0.27 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
菊科小 葉菜類	粉蝨類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菊科小 葉菜類	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
菊科小 葉菜類	薊馬類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
菊科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.03- 0.17 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茄科小 葉菜類	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
茄科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.1-0.33 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
枸杞	粉蝨類	0.1-0.3	4,500	害蟲發生	7			9	適用於枸杞	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。					葉	
蔥科小 葉菜類	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
蔥科小 葉菜類	薊馬類	0.1-0.3 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免施用於 弱勢苗，以 免發生藥 害。	
蔥科小 葉菜類	葉部薊 馬類	0.17- 0.25 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
葫蘆科 小葉菜 類	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
龍鬚菜	粉蟲類	0.2-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7				安全採收 期：9天(設 施栽培15 天)。	
繖形花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
芹菜	蚜蟲類	0.02- 0.07 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
唇形花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									生藥害。	
羅勒	蚜蟲類	0.02- 0.07 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
藜科小 葉菜類	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
菠菜	粉蟲類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菠菜	蚜蟲類	0.02- 0.07 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茭白筍	長綠飛 蟲	0.27- 0.33 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		21		
竹	蚜蟲類	0.02- 0.07 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
旋花科 根菜類	粉蟲類	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科根 菜類	粉蟲類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科根 菜類	葉部薊 馬類	0.1-0.13 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
山藥	葉部薊 馬類	0.17- 0.25 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科根菜	粉蟲類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
類				藥。						
十字花 科根菜 類	偽菜蚜	0.07-0.1 公升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菊科根 菜類	粉蝨類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菊科根 菜類	蚜蟲類	0.02- 0.07 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菊科根 菜類	薊馬類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菊科根 菜類	葉部薊 馬類	0.03- 0.17 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
牛蒡	蚜蟲類	0.02- 0.07 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茄科根 菜類	葉部薊 馬類	0.1-0.33 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
馬鈴薯	粉蝨類	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
蔥科根 菜類	蚜蟲類	0.07-0.1 公升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
蔥科根 菜類	薊馬類	0.1-0.3 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免施用於 弱勢苗，以 免發生藥 害。	
蔥科根 菜類	葉部薊 馬類	0.17- 0.25 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
										刪除。
芋	蚜蟲類	0.07-0.1公升	12,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
茄科果菜類	粉蝨類	0.1-0.3公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
茄科果菜類	葉部薊馬類	0.1-0.33公升	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
茄子	南黃薊馬	0.17-0.25公升	6,000	害蟲發生時開始施藥。				6		與大類範圍重疊，本項刪除。
金針	蚜蟲類	0.07-0.1公升	12,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
洛神葵	蚜蟲類	0.1-0.2公升	6,000	蚜蟲發生初期全株施藥 1 次。				6	注意藥液需噴及新梢處。	
秋葵	粉蝨類	0.1-0.4公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
秋葵	葉部薊馬類	0.1-0.33公升	6,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
<u>冬瓜</u> <u>南瓜</u> <u>胡瓜</u> <u>苦瓜</u> <u>夏南瓜</u> <u>隼人瓜</u> <u>絲瓜</u> <u>越瓜</u> <u>扁蒲</u> <u>木鼈果</u>	粉蝨類	0.2-0.4公升	4,500	害蟲發生時開始施藥。	7				安全採收期：9 天(設施栽培 15 天)。	本項修正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
瓜菜類	粉蝨類	0.2-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		重 複 範 圍，本項 刪除。
冬瓜 南瓜 胡瓜 苦瓜 夏南瓜 隼人瓜 絲瓜 越瓜 扁蒲 木鼈果	葉部 薊 馬類	0.2-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本 項 修 正。
胡瓜	南黃薊 馬	0.17- 0.25 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與 大 類 範 圍 重 疊，本項 刪除。
冬瓜	銀葉粉 蝨	0.2-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與 大 類 範 圍 重 疊，本項 刪除。
豆菜類	粉蝨類	0.2-0.3 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆菜類	粉蝨類	0.02- 0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	重 複 範 圍，本項 刪除。
豆菜類	葉部 薊 馬類	0.17- 0.25 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆菜類	葉部 薊 馬類	0.1-0.13 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		重 複 範 圍，本項 刪除。
大豆	銀葉粉 蝨	0.2-0.3 公升	4,500	害蟲發生 時開始施	7			9	限毛豆使 用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
瓜果類	粉蝨類	0.2-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
瓜果類	銀葉粉 蝨	0.2-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
瓜果類	薊馬類	0.17- 0.25 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
瓜果類	葉部薊 馬類	0.2-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
瓜果類	南黃薊 馬	0.17- 0.25 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
香蕉	薊馬類	0.07-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
木瓜	蚜蟲類	0.07-0.2 公升	12,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				6		
番荔枝	薊馬類	0.5-0.67 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
番荔枝	小黃薊 馬	0.17- 0.25 公 升	4,500	害蟲於幼 嫩心葉發 生時開始 施藥。	7	3-4		12	施藥時應噴 及幼嫩心 葉。	與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
酪梨	薊馬類	0.5-0.67 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
草莓	葉部薊 馬類	0.17- 0.25 公	6,000	害蟲發生 時開始施	7				限開花前使 用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		升		藥。						
葡萄	薊馬類	0.15- 0.25 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2			採收前 12 天(設施栽 培 18 天)停 止施藥。	
楊桃	薊馬類	0.1-0.3 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
蓮霧	葉蟬類	0.1-0.33 公升	9,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
蓮霧	薊馬類	0.2-0.5 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
蓮霧	腹鈎薊 馬	0.17- 0.25 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	14	1-2		9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
蓮霧	米爾頓 紬小蜂	0.2-0.5 公升	6,000	花謝後開 始施藥至 套袋前。	14			9	避免於開花 期施藥。	
番石榴	葉蟬類	0.13- 0.23 公 升	9,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9	避免施用於 生長勢弱之 幼苗，以免 發生藥害。	
番石榴	薊馬類	0.2-0.3 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
桑樹	桑木蝨	0.17- 0.37 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
檬果	綠葉蟬	0.17- 0.23 公 升	9,000	抽穗及開 花期害蟲 發生時開 始施藥。	10			9		
檬果	檬果木 蝨	0.2-0.43 公升	4,500	害蟲發生 時開始施	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
檬果	薊馬類	0.2-0.43 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
<u>梨</u> <u>蘋果</u> <u>桃</u> <u>梅</u> <u>李</u> <u>杏</u> <u>枇杷</u>	薊馬類	0.1-0.42 公升	4500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本 項 修 正。
梨	柑桔捲 葉蚜	0.2-0.25 公升	6,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				14		
梨	梨木蝨	0.53 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
蘋果	蚜蟲類	0.1-0.13 公升	9,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
桃	蚜蟲類	0.1-0.23 公升	9,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
梅	蚜蟲類	0.13-0.2 公升	9,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
李	蚜蟲類	0.1-0.23 公升	9,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
枇杷	蚜蟲類	0.17- 0.23 公 升	9,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
<u>棗</u> <u>印度棗</u>	蚜蟲類	0.1-0.13 公升	9,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		本 項 修 正。
<u>棗</u>	薊馬類	0.1-0.42 公升	4,500	害蟲發生 時開始施	7			9		本 項 修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
印度棗	薊馬類	0.1-0.42 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本 項 修 正。
柿	夜蛾類	0.25- 0.33 公 升	4,500	於幼果期 施藥。	7			9		
柿	薊馬類	0.1-0.42 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
柑桔類	薊馬類	0.2-0.5 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	勿 用 於 花 期。	
花木	粉蝨類	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
刺桐屬 植物	刺桐紬 小蜂								1. 每公頃 每次用 藥量： 植株胸 徑小於 20 公 分者， 施 用 10 毫 升；胸 徑每增 加 10 公分， 則增加 5 毫升 (1 處)。 2. 於樹幹 胸高處	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									(約 130 公分) 以電鑽鑽直徑 1 公分深度 10 公分的孔洞 (與樹幹角度約為 45 度), 每一孔洞注入 5 毫升藥劑。 3. 藥劑注射完成後, 以中性矽利康膠塗佈孔洞表面封口, 以避免藥劑蒸散。 4. 電鑽頭及針頭需以 75% 酒精消毒後使用。 5. 孔洞盡	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									量均勻 分布於 樹幹， 避免施 作於一 處。	
菊	夜蛾類	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	粉蝨類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	蚜蟲類	0.03-0.1 公升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	薊馬類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	薊馬類	0.1-0.3 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		重 複 範 圍，本項 刪除。
洋甘菊	粉蝨類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
野薑	夜蛾類	0.23- 0.57 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	限開花前使 用。	
百合	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10			6	限食用花苞 品種使用。	
百合	薊馬類	0.17- 0.25 公 升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。				6		
蓮	夜蛾類	0.27-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	施藥時應噴 及葉背。	
蓮	蚜蟲類	0.1-0.17	12,000	害蟲發生	7-10			12	限開花前使	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。					用。	
蓮	葉部 薊 馬類	0.17- 0.25 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	禁止使用於 蓮子。	
蓮	小黃 薊 馬	0.27-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	施藥時應噴 及葉背。	
玫瑰	蚜蟲類	0.08 公 升	12,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7-10			12		
玫瑰	薊馬類	0.23- 0.57 公 升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
臺灣 樂 樹	椿象類	0.1-0.3 公升	6,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				避免於開花 期使用。	
山茶	葉蟬類	0.1-0.3 公升	9,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7					
睡蓮	薊馬類	0.3-0.4 公升	4,500	害蟲發生 時施藥 1 次。				12	避免於開花 期使用。	
茶	柑桔刺 粉蟲	0.17 公 升	6,000	害蟲發生 時施藥 1 次。				12		
茶	葉蟬類	0.1-0.3 公升	9,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	適用於茶 葉。	
茶	小綠葉 蟬	0.1 公升	9,000	萌芽初期 害蟲發生 時施藥。				12		
茶	小黃 薊 馬	0.17 公 升	6,000	萌 芽 初 期，害蟲 發生時開				12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				始施藥。						
黃耆	粉蝨類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	粉蝨類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	蚜蟲類	0.02- 0.08 公 升	12,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	薊馬類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
艾草	粉蝨類	0.1-0.2 公升	4,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
亞洲棕 櫚	象鼻蟲 類	0.67-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。					藥劑由葉 芽,葉腋等 處灌注整叢 植株內,每 十天一次連 續兩次。	
可可	蚜蟲類	0.2-0.3 公升	6,000	蚜蟲發生 時施藥 1 次。				14	提高施用濃 度,可能引 起藥害發 生。	
蘭科作 物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	

9.6(%) (w/w) 益達胺 溶液 (SL)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蝨	0.4 公升	3,000	5 隻/叢, 施 1 次。				10	其後 20 隻/叢, 施第二次, 特別注意孕穗期至抽穗初期之防除。	
水稻	斑飛蝨	0.75 公升	1,600	抽穗後。				10		
茶	葉蟬類	0.3-1.0 公升	3,000	發芽初期 害蟲發生時開始施藥。	7			12	適用於茶籽。	
油茶	葉蟬類	0.3-1.0 公升	3,000	發芽初期 害蟲發生時開始施藥。	7			12		
胡麻	葉部薊馬類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免施用於弱勢苗。	
十字花科包葉菜類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
十字花科包葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用, 避免施用於弱勢苗, 以免發生藥害。	
十字花科包葉菜類	偽菜蚜	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
花椰菜	銀葉粉蝨	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。		2		9		
菊科包葉菜類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菊科包葉菜類	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科包葉菜類	薊馬類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
菊科包葉菜類	葉部薊馬類	0.1-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
旋花科小葉菜類	粉蝨類	0.2-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
旋花科小葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
蘿菜	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
甘藷	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	限用於葉用甘藷。	與大類範圍重疊，本項刪除。
豆科小葉菜類	葉部薊馬類	0.3-0.4公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
豌豆	粉蝨類	0.3-0.5公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
十字花科小葉菜類	粉蝨類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
十字花科小葉	蚜蟲類	0.1-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施	7			9	避免開花時使用，避免	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜類				藥。					施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
十字花科小葉菜類	偽菜蚜	0.2-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
芥藍	銀葉粉蝨	0.6-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		9		
菊科小葉菜類	粉蝨類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科小葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
菊科小葉菜類	薊馬類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
菊科小葉菜類	葉部薊馬類	0.1-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
茄科小葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
茄科小葉菜類	葉部薊馬類	0.3-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
枸杞	粉蝨類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9	適用於枸杞葉	
蔥科小	蚜蟲類	0.1-0.2	4,000	害蟲發生	7			9	避免開花時	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葉菜類		公升		時開始施藥。					使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
蔥科小葉菜類	薊馬類	0.4-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
蔥科小葉菜類	葉部薊馬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		與大類範圍重疊，本項刪除。
葫蘆科小葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
龍鬚菜	粉蟲類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7				9 天(設施栽培 15 天)。	
繖形花科小葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
芹菜	蚜蟲類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
唇形花科小葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免開花時使用，避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
羅勒	蚜蟲類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
										刪除。
藜科小 葉菜類	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
菠菜	粉蟲類	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
菠菜	蚜蟲類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茭白筍	長綠飛 蟲	0.8-1.0 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		21		
竹	蚜蟲類	0.06-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
旋花科 根菜類	粉蟲類	0.2-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科根 菜類	粉蟲類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
豆科根 菜類	葉部薊 馬類	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			3		
山藥	葉部薊 馬類	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
十字花 科根菜 類	粉蟲類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
十字花 科根菜 類	偽菜蚜	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菊科根菜類	粉蝨類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	薊馬類	0.2-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
菊科根菜類	葉部薊馬類	0.1-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		與大類範圍重疊，本項刪除。
牛蒡	蚜蟲類	0.06-0.2公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		與大類範圍重疊，本項刪除。
茄科根菜類	葉部薊馬類	0.3-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
馬鈴薯	粉蝨類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蔥科根菜類	蚜蟲類	0.2-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蔥科根菜類	薊馬類	0.4-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9	避免施用於弱勢苗，以免發生藥害。	
蔥科根菜類	葉部薊馬類	0.5-0.75公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		與大類範圍重疊，本項刪除。
芋	蚜蟲類	0.2-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茄科果菜類	粉蝨類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
茄科果菜類	葉部薊馬類	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
茄子	南黃薊馬	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。				6		
金針	蚜蟲類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
洛神葵	蚜蟲類	0.3-0.6 公升	2,000	蚜蟲發生初期全株施藥 1 次。				6	注意藥液需噴及新梢處。	
秋葵	粉蝨類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
秋葵	葉部薊馬類	0.3-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
<u>冬瓜</u> <u>南瓜</u> <u>胡瓜</u> <u>苦瓜</u> <u>夏南瓜</u> <u>隼人瓜</u> <u>絲瓜</u> <u>越瓜</u> <u>扁蒲</u> <u>木鼈果</u>	粉蝨類	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		本項修正。
<u>冬瓜</u> <u>南瓜</u> <u>胡瓜</u> <u>苦瓜</u> <u>夏南瓜</u>	葉部薊馬類	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		本項修正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
<u>隼人瓜</u> <u>絲瓜</u> <u>越瓜</u> <u>扁蒲</u> <u>木鼈果</u>										
胡瓜	南黃薊 馬	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
冬瓜	銀葉粉 蝨	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	粉蝨類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		重複範圍，本項刪除。
豆菜類	粉蝨類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	避免開花時 使用，避免 施用於弱勢 苗，以免發 生藥害。	
豆菜類	葉部薊 馬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		重複範圍，本項刪除。
<u>豆菜類</u>	葉部薊 馬類	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本項修正。
大豆	銀葉粉 蝨	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	限毛豆使 用。	
瓜果類	粉蝨類	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
<u>洋香瓜</u> 	銀葉粉 蝨	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		本項修正。
瓜果類	葉部薊 馬類	0.6-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
西瓜	南黃薊馬	0.5-0.75公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		本項修正。
香蕉	薊馬類	0.2-0.6公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
木瓜	蚜蟲類	0.2-0.6公升	4,000	害蟲發生時施藥 1 次。				6		
番荔枝	薊馬類	1.5-2.0公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
番荔枝	小黃薊馬	0.5-0.75公升	1,500	害蟲於幼嫩心葉發生時開始施藥。	7	3-4		9	施藥時應噴及幼嫩心葉。	
酪梨	薊馬類	1.5-2.0公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
草莓	葉部薊馬類	0.5-0.75公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限開花前使用。	
楊桃	薊馬類	0.4-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蓮霧	葉蟬類	0.3-1 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	10			9		
蓮霧	薊馬類	0.6-1.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			9		
蓮霧	腹鈎薊馬	0.5-0.75公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14	1-2		9		
蓮霧	米爾頓紬小蜂	0.5-0.75公升	2,000	花謝後開始施藥至套袋前。	14			9	避免於開花期施藥。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
番石榴	葉蟬類	0.4-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9	避免施用於 生長勢弱之 幼苗，以免 發生藥害。	
番石榴	薊馬類	0.6-1 公 升	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
桑樹	桑木蝨	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
檬果	綠葉蟬	0.5-0.7 公升	3,000	抽穗及開 花期害蟲 發生時開 始施藥。	10			6		
檬果	檬果木 蝨	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
檬果	薊馬類	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
<u>梨</u> <u>蘋果</u> <u>桃</u> <u>梅</u> <u>李</u> <u>杏</u> <u>枇杷</u>	薊馬類	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		本 項 修 正。
梨	柑桔捲 葉蚜	0.5-0.8 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。				6		
梨	梨木蝨	1.6 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	2		9		
蘋果	蚜蟲類	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	10			9		
桃	蚜蟲類	0.3-0.7	3,000	害蟲發生	10			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
梅	蚜蟲類	0.4-0.6 公升	3,000	害蟲發生 時開始施藥。	10			9		
李	蚜蟲類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施藥。	10			9		
枇杷	蚜蟲類	0.5-0.7 公升	3,000	害蟲發生 時開始施藥。	10			9		
棗 印度棗	蚜蟲類	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生 時開始施藥。	10			9		本 項 修 正。
棗	薊馬類	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			9		本 項 修 正。
印度棗	薊馬類	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			9		本 項 修 正。
柿	夜蛾類	0.75-1.0 公升	1,500	於幼果期 施藥。	7			12		
柿	薊馬類	0.3-1.25 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			9		
柑桔類	薊馬類	0.7-1.6 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			21	勿用於花期。	
花木	粉蝨類	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
刺桐屬 植物	刺桐紬 小蜂								1. 每公頃 每次用 藥量： 植株胸	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									徑小於 20 公分者，施用 10 毫升；胸徑每增加 10 公分，則增加 5 毫升（1 處）。 2. 於樹幹胸高處（約 130 公分）以電鑽鑽直徑 1 公分深度 10 公分的孔洞（與樹幹角度約為 45 度），每一孔洞注入 5 毫升藥劑。 3. 藥劑注射完成後，以中性砂	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									利康膠 塗佈孔 洞表面 封口， 以避免 藥劑蒸 散。 4. 電鑽頭 及針頭 需 以 75% 酒 精消毒 後 使 用。 5. 孔洞盡 量均勻 分布於 樹幹， 避免施 作於一 處。	
菊	夜蛾類	0.2-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	蚜蟲類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
菊	薊馬類	0.2-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		重 複 範 圍，本項 刪除。
菊	薊馬類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
洋甘菊	粉蝨類	0.2-0.7	1,500	害蟲發生	7			12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。						
野薑	夜蛾類	0.7-1.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			12	限開花前使用。	
百合	蚜蟲類	0.3-0.6 公升	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7-10			6	限食用花苞 品種使用。	
蓮	夜蛾類	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	施藥時應噴 及葉背。	
蓮	蚜蟲類	0.3-0.5 公升	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7-10			12	限開花前使用。	
蓮	葉部 薊 馬類	0.5-0.75 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	禁止使用於 蓮子。	
蓮	小 黃 薊 馬	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			6	施藥時應噴 及葉背。	
玫瑰	蚜蟲類	0.25 公 升	4,000	害蟲發生 時開始施藥。	7-10					
玫瑰	薊馬類	0.7-1.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施藥。	7			12		
臺灣樂 樹	椿象類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生 時開始施藥。	7				避免於開花 期使用。	
山茶	葉蟬類	0.3-1.0 公升	3,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施藥。	7					
睡蓮	薊馬類	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時施藥 1 次。				12	避免於開花 期使用。	
茶	柑桔刺	0.5 公升	2,000	害蟲發生				12		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	粉蝨			時施藥 1 次。						
茶	葉蟬類	0.3-1.0 公升	3,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	適用於茶 葉。	
茶	小綠葉 蟬	0.35 公 升	3,000	萌芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。				12		
茶	小黃薊 馬	0.5 公升	2,000	萌 芽 初 期，害 蟲 發生時開 始施藥。				12		
黃耆	粉蝨類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	蚜蟲類	0.1-0.2 公升	4,200	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
風茹	薊馬類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
艾草	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12		
亞洲棕 櫚	象鼻蟲 類	2-3 公 升	500	害蟲發生 時開始施 藥。					藥劑由葉 芽，葉腋等 處灌注整叢 植株內，每 十天一次連 續兩次；加 展著劑「嘉 農 90」3,000	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									倍。	
可可	蚜蟲類	0.5-1 公 升	2,000	蚜蟲發生 時施藥 1 次。				14	提高施用濃 度，可能引 起藥害發 生。	
蘭科作物	檢疫處 理			檢疫處理 時施藥 1 次。					施藥量及稀 釋倍數依輸 入國之規定 處理。	

200 g/L(20% w/v) 益達胺 溶液 (SL)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
十字花科包 葉菜類、 結球萵苣	蚜蟲類	0.15 公升	8,000	害蟲發 生時施 藥 1 次。				9	避免在 作物開 花期施 藥。	本項新 增。原始 登記廠 商名稱： 台灣拜 耳股份 有限公 司。