

「鮎澤蘇力菌 Ab12」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 3 月 20 日農授防字第 1151875426G 號公告修正

60% (30,000 DBMU/mg) 鮎澤蘇力菌 Ab12 可溼性粉劑 (WP)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
乾豆類	夜蛾類	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				與大類範圍 重疊，本項刪 除。
十字花 科包葉 菜類	鱗翅目 害蟲	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				與大類範圍 重疊，本項刪 除。
甘藍	小菜蛾	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				
十字花 科小葉 菜類	鱗翅目 害蟲	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				與大類範圍 重疊，本項刪 除。
十字花 科根菜 類	鱗翅目 害蟲	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次				與大類範圍 重疊，本項刪 除。
大豆	夜蛾類	1.3-1.6 公 斤	750	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 3 次			適用於毛 豆。	與大類範圍 重疊，本項刪 除。
蔬菜	鱗翅目 害蟲	<u>0.67-2.67 公斤</u>	<u>750</u>	<u>害蟲發生 時開始施 藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續 3 次</u>				本項新增。 原始登記廠 商名稱：福 壽實業股份 有限公司。