

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

## 「扶比胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告

### 一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
扶比胺	florypicoxamid	(1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methylethyl N-[(3-acetoxy-4-methoxy-2-pyridyl)carbonyl]-L-alaninate

### 二、「扶比胺」農藥使用方法與範圍一覽表

100 g/L (10% w/v) 扶比胺 EC(乳劑)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茶	赤葉枯病	1.25 公升	800	修剪後立即施藥。	7	共 2 次		26		原始登記廠商名稱：台灣道禮股份有限公司
辣椒	炭疽病	1.25 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		

100 g/L (10% w/v) 扶比胺 SC(水懸劑)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茶	赤葉枯病	1.25 公升	800	修剪後立即施藥。	7	共 2 次		26		原始登記廠商名稱：台灣道禮股份有限公司
辣椒	炭疽病	1.25 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		