

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

「亞克瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國○年○月○日農授防字第○號公告修正

100 g/L (10% w/v) 亞克瑞 水分散性乳劑 (DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.33 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7-14 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	
番茄	薊馬類	0.33-0.67 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	
甜椒	薊馬類	0.33-0.67 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	
辣椒	薊馬類	0.33-0.67 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	
茄子	薊馬類	0.33-0.67 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	
枸杞	薊馬類	0.33-0.67 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	
香瓜茄	薊馬類	0.33-0.67 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免	

※此為預先通知內容，增修部分須待正式公告後始得生效※

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				天施藥 1 次。					施藥。	
樹番茄	薊馬類	0.33-0.67 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	
柑桔類	葉蟬類	0.33 公升	6,000	害蟬發生初期（平均每葉達 3-5 隻）施藥 1 次。				14	開花期及生物防治期間避免施藥。	
香瓜 洋香瓜	薊馬類	0.33-0.67 公升	3,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2 次		7	開花期及生物防治期間避免施藥。	本項新增。