

「扶比胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 5 月 29 日農授防字第 1151877374A 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
扶比胺	florylpicoxamid	(1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methylethyl N-[(3-acetoxy-4-methoxy-2-pyridyl)carbonyl]-L-alaninate

二、「扶比胺」農藥使用方法與範圍一覽表

100 g/L (10% w/v) 扶比胺 EC(乳劑)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意 事項	說明
茶	赤葉枯 病	1.25 公 升	800	修剪後立即 施藥。	7	共 2 次		26		原始登記廠商名 稱：台灣道禮股份 有限公司
辣椒	炭疽病	1.25 公 升	800	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 2 次		3		

100 g/L (10% w/v) 扶比胺 SC(水懸劑)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意 事項	說明
茶	赤葉枯 病	1.25 公 升	800	修剪後立即 施藥。	7	共 2 次		26		原始登記廠商名 稱：台灣道禮股份 有限公司
辣椒	炭疽病	1.25 公 升	800	病害發生初 期開始施 藥。	7	共 2 次		3		