

「凡殺歐西比」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 5 月 29 日農授防字第 1151877374C 號公告修正

330 g/L (33% w/v) 凡殺歐西比 濃懸乳劑 (SE)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
番茄	疫病	0.5 公升	2,400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		3		
胡瓜	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		3		
葡萄	露菌病	0.8 公 升	1,500	盛花至幼 果期開始 施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次，共 2 次。				60	採收前發生 病害時，請 選擇其他安 全採收期較 短之藥劑。	
<u>甜椒</u> <u>茄子</u> <u>辣椒</u> <u>枸杞</u> <u>香瓜茄</u> <u>樹番茄</u>	<u>疫病</u>	<u>0.5 公升</u>	<u>2,400</u>	<u>病害發生</u> <u>初期開始</u> <u>施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續</u> <u>3 次</u>		<u>3</u>		本項新增。原始登記廠商名稱：台灣科迪華農業科技股份有限公司。