

「賽速安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 5 月 29 日農授防字第 1151877374D 號公告修正

300 g/L (30% w/v) 賽速安勃 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	夜蛾類	1.7 毫升	300	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱，每育苗箱稀釋水量 300 毫升。		限育苗箱使用。	
水稻	樹蔭蝶	1.7 毫升	300	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱，每育苗箱稀釋水量 300 毫升。		限育苗箱使用。	
水稻	稻苞蟲	1.7 毫升	300	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱，每育苗箱稀釋水量 300 毫升。		限育苗箱使用。	
水稻	稻心蠅	1.7 毫升	300	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱，每育苗箱稀釋水量 300 毫升。		限育苗箱使用。	
落花生	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2 次		21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
綠豆	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2次		21		
紅豆	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2次		21		
大豆	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2次		21	適用於乾 豆。	
花豆	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2次		21	適用於乾 豆。	
樹豆	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2次		21	適用於乾 豆。	
豇豆	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2次		21	適用於乾 豆。	
十字花 科包葉 菜類	菜心螟	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天)停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	大菜螟	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天)停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	夜蛾類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									18 天) 停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	小菜蛾	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	紋白蝶	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	毒蛾類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天) 停止 施藥。	
菊科包 葉菜類	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		12		
菊科包 葉菜類	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		12		
薤菜	夜蛾類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6	禁用於水域 栽培薤菜。	
薤菜	毒蛾類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6	禁用於水域 栽培薤菜。	
甘藷	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6	適用於葉用 甘藷。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
甘藷	蝦殼天 蛾	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6	適用於葉用 甘藷。	
甘藷	烏羽蛾 類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6	適用於葉用 甘藷。	
甘藷	金花蟲 類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6	適用於葉用 甘藷。	
豌豆	螟蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
豌豆	夜蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
豌豆	毒蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	菜心螟	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	大菜螟	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	夜蛾類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	小菜蛾	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	紋白蝶	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
十字花 科小葉 菜類	毒蛾類	0.4-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
十字花	植食性	0.4-0.5	3,000	害蟲發	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
科小葉 菜類	瓢蟲類	公升		生時開 始施藥。						
菊科小 葉菜類	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6		
菊科小 葉菜類	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6		
茄科小 葉菜類	夜蛾類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6		
茄科小 葉菜類	毒蛾類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6		
茄科小 葉菜類	植食性 瓢蟲類	0.2-0.5 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6		
蔥科小 葉菜類	夜蛾類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		9		
蔥科小 葉菜類	毒蛾類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		9		
蔥	夜蛾類	0.2-0.3 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	2		9		
芹菜	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6		
芹菜	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6		
羅勒	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	共 1- 2 次		6		
羅勒	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發 生時開	7	共 1- 2 次		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				始施藥。						
紫蘇	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		
紫蘇	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		
菠菜	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		
菠菜	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		
菠菜	甜菜白帶野螟蛾	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		
莧菜	夜蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		
莧菜	毒蛾類	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		
莧菜	甜菜白帶野螟蛾	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		
豆薯	螟蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
豆薯	夜蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
豆薯	毒蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
茄科果 菜類	夜蛾類	0.1-0.4 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 1-2 次		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
番茄	夜蛾類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發 生時施 藥1次。	7			6		
豆菜類	螟蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
豆菜類	夜蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
豆菜類	毒蛾類	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			6		
草莓	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7			7		
花木	夜蛾類	0.2-0.6 公升	4,000	害蟲發 生時開 始施藥。	7	最多 2次			1. 限觀賞 花卉使 用，使 用前宜 先進行 小面積 藥害測 試。 2. 避免於 開花期 使用。	
蠶豆	鱗翅目 害蟲	0.2 - 0.3 公升	4,000	害蟲發 生初期 開始施 藥。	7	連續 2次		21	適用於乾 豆。	本項新 增。

40(%) (w/w) 賽速安勃 水分散性粒劑 (WG)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	瘤野螟	1.0 公克	500	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	夜蛾類	1.0 公克	500	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	樹蔭蝶	1.0 公克	500	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	稻苞蟲	1.0 公克	500	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育 苗箱，每育 苗箱稀釋水 量 500 毫 升。		限育苗箱使 用。	
水稻	稻心蠅	1.0 公克	500	插秧前 24 小時。			插秧前 24 小時，將藥 劑稀釋液均 勻噴灑至育		限育苗箱使 用。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
							苗箱，每育苗箱稀釋水量 500 毫升。			
十字花 科包葉 菜類	菜心螟	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天)停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	大菜螟	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天)停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	夜蛾類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天)停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	紋白蝶	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天)停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	毒蛾類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天)停止 施藥。	
十字花 科包葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			12	包葉菜類採 收前 12 天 (設施栽培 18 天)停止 施藥。	
豌豆	螟蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
豌豆	夜蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
豌豆	毒蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	適用於葉用 豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	菜心螟	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天)停止 施藥。	
十字花 科小葉 菜類	大菜螟	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天)停止 施藥。	
十字花 科小葉 菜類	夜蛾類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天)停止 施藥。	
十字花 科小葉 菜類	紋白蝶	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天)停止 施藥。	
十字花 科小葉 菜類	毒蛾類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天)停止 施藥。	
十字花 科小葉 菜類	植食性 瓢蟲類	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天)停止 施藥。	
豆薯	螟蛾類	0.1-0.2	5,000	害蟲發生	7			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公斤		時開始施 藥。						
豆薯	夜蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆薯	毒蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆菜類	螟蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	夜蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
豆菜類	毒蛾類	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
草莓	夜蛾類	0.2-0.5 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		