

## 「特安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 5 月 29 日農授防字第 1151877374G 號公告修正

480 g/L (48% w/v) 特安勃 種子處理用水懸劑 (FS)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                                                                                     | 安全採收期(天) | 注意事項                                                                        | 說明 |
|------|------|---------|------|------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 水稻   | 瘤野螟  |         |      |      |         |      | 1. 每公斤稻種混拌 1.5 毫升藥劑和 15 毫升水。<br>2. 乾稻種直接與藥劑混拌均勻。<br>3. 混拌藥液之稻種，進行風乾，使藥液完全附著於稻種，再行浸種催芽育苗。 |          | 1. 使用時添加拌種用樹脂 (Peridia m® EC 104) 2 毫升。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為 30 天，以免蓄積殘留。 |    |

200 g/L(20% w/v) 特安勃 水懸劑 (SC)

| 作物名稱   | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數   | 使用時期          | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                                             | 說明 |
|--------|------|-------------|--------|---------------|---------|------|------|----------|--------------------------------------------------|----|
| 水稻     | 瘤野螟  | 0.15 公升     | 5,000  | 害蟲發生初期施藥 1 次。 |         |      |      | 40       | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為 30 天，以免蓄積殘留。 |    |
| 十字花科包葉 | 夜蛾類  | 0.07-0.10 公 | 10,000 | 害蟲發生時全        |         |      |      | 3        | 1. 避免於開花期使用。                                     |    |

| 作物<br>名稱                | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期                 | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                           | 說明 |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------------------------------------------|----|
| 菜類                      |          | 升                    |          | 株施藥<br>1次。               |                 |          |          |                  | 2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。                 |    |
| 結球萵苣                    | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 3                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。 |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類        | 夜蛾類      | 0.06-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。 |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類        | 小菜蛾      | 0.05 公<br>升          | 10,000   | 害蟲發<br>生初期<br>施藥 1<br>次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免蓄積殘留。 |    |
| 不結球<br>萵苣與<br>半結球<br>萵苣 | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天,以免      |    |

| 作物<br>名稱  | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期                 | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                                   | 說明 |
|-----------|----------|----------------------|----------|--------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|           |          |                      |          |                          |                 |          |          |                  | 蓄積殘留。                                                                  |    |
| 茼蒿        | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範<br>圍作物輪<br>作期間為<br>30天,以免<br>蓄積殘留。 |    |
| 山茼蒿       | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範<br>圍作物輪<br>作期間為<br>30天,以免<br>蓄積殘留。 |    |
| 紅鳳菜       | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範<br>圍作物輪<br>作期間為<br>30天,以免<br>蓄積殘留。 |    |
| 白鳳菜       | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範<br>圍作物輪<br>作期間為<br>30天,以免<br>蓄積殘留。 |    |
| 芳香萬<br>壽菊 | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範                                    |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期     | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                         | 說明 |
|----------|----------|-----------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------|----|
|          |          |                 |          |              |                 |          |          |                  | 園作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。                                          |    |
| 闊包菊      | 夜蛾類      | 0.08-0.10 公升    | 10,000   | 害蟲發生時全株施藥1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。               |    |
| 枸杞       | 夜蛾類      | 0.05-0.10 公升    | 10,000   | 害蟲發生時全株施藥1次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。<br>3. 適用於枸杞葉。 |    |
| 番茄       | 夜蛾類      | 0.05-0.10 公升    | 10,000   | 害蟲發生時全株施藥1次。 |                 |          |          | 3                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。               |    |
| 甜椒       | 夜蛾類      | 0.05-0.10 公升    | 10,000   | 害蟲發生時全株施藥1次。 |                 |          |          | 3                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天，以免                    |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量      | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期                 | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                                   | 說明 |
|----------|----------|----------------------|----------|--------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|          |          |                      |          |                          |                 |          |          |                  | 蓄積殘留。                                                                  |    |
| 辣椒       | 夜蛾類      | 0.05-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 3                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範<br>圍作物輪<br>作期間為<br>30天,以免<br>蓄積殘留。 |    |
| 茄子       | 夜蛾類      | 0.05-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 3                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範<br>圍作物輪<br>作期間為<br>30天,以免<br>蓄積殘留。 |    |
| 枸杞       | 夜蛾類      | 0.05-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 3                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範<br>圍作物輪<br>作期間為<br>30天,以免<br>蓄積殘留。 |    |
| 香瓜茄      | 夜蛾類      | 0.05-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 3                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範<br>圍作物輪<br>作期間為<br>30天,以免<br>蓄積殘留。 |    |
| 樹番茄      | 夜蛾類      | 0.05-<br>0.10 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1次。 |                 |          |          | 3                | 1. 避免於開<br>花期使用。<br>2. 與非本藥<br>劑核准範                                    |    |

| 作物<br>名稱                          | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量     | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期                  | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                          | 說明    |
|-----------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                   |          |                     |          |                           |                 |          |          |                  | 園作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。                                           |       |
| 洋蔥<br>胡蘿蔔<br>甘藷<br>蘿蔔<br>馬鈴薯<br>薑 | 夜蛾類      | 0.05-<br>0.1 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1 次。 |                 |          |          | 7                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。                | 本項新增。 |
| 蒜                                 | 夜蛾類      | 0.05-<br>0.1 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1 次。 |                 |          |          | 7                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。<br>3. 適用於蒜頭。   | 本項新增。 |
| 甘藷                                | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.1 公<br>升 | 10,000   | 害蟲發<br>生時全<br>株施藥<br>1 次。 |                 |          |          | 2                | 1. 避免於開花期使用。<br>2. 與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為30天，以免蓄積殘留。<br>3. 適用於葉用甘藷。 | 本項新增。 |

| 作物<br>名稱                                                                                                          | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量     | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期                                             | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                                                                                           | 說明        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>薤菜</u><br><u>芫荽</u><br><u>芹菜</u><br><u>菠菜</u><br><u>莧菜</u><br><u>羅勒</u><br><u>紫蘇</u><br><u>仙草</u><br><u>薄荷</u> | 夜蛾類      | 0.08-<br>0.1 公<br>升 | 10,000   | <u>害蟲發</u><br><u>生時全</u><br><u>株施藥</u><br><u>1次。</u> |                 |          |          | 2                | 1. <u>避免於開</u><br><u>花期使用。</u><br>2. <u>與非本藥</u><br><u>劑核准範</u><br><u>圍作物輪</u><br><u>作期間為</u><br><u>30天，以免</u><br><u>蓄積殘留。</u> | 本項新<br>增。 |