

「三元硫酸銅」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年○月○日農授防字第○號公告修正

27.12 (%) (w/w) 三元硫酸銅 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	葉部細菌性病	1-1.5 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
豌豆	葉部細菌性病	1-1.5 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			適用於葉用豌豆。	本項修正。
枸杞	細菌性斑點病	1-3 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			適用於枸杞葉。	
蔥	疫病	2.4-4 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	2				
蔥	細菌性軟腐病	2.4-4 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	2				
豆薯	葉部細菌性病	1-1.5 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
狗尾草	葉部細菌性病	1-1.5 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
闊葉大豆	葉部細菌性病	1-1.5 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				本項修正。
馬鈴薯	細菌性斑點病	1-3 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
芋	疫病	1.2 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	2				
茄科果菜類	細菌性斑點病	1-4 公升	500	病害發生初期開始	7	3				重複範圍，本項刪除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥一						
茄科果菜類	細菌性斑點病	1-3 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
甜椒	細菌性斑點病	2-3 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	3				
瓜菜類	露菌病	1.5 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	3				
豆菜類	葉部細菌性病	1.7 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				本項修正。
瓜果類	露菌病	1.5 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	3				
木瓜	果疫病	0.6-2.5 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
鳳梨	心腐病	1.3-2.5 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
番荔枝	果疫病	0.9-1.9 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
酪梨	疫病	1.3-2.5 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
百香果	疫病	1-2 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
紅毛丹	果疫病	0.8-1.5 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
葡萄	黑痘病	1.5 公升	800	新芽萌發果穗形成後施藥。	7	5-7			新芽未萌發前施藥一次。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蓮霧	疫病		800	病害發生初期開始施藥。	7	5				
番石榴	疫病	1.5-2.5公升	800	病害發生初期開始施藥。	7				施藥至套袋前為止。	
無花果	白腐病	1.0-2.0公升	800	病害發生初期開始施藥。	7					
荔枝	露疫病	0.8-1.5公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
椪果	果疫病	1.1-2.5公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
椪果	細菌性黑斑病	2-2.4公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	5			試驗時加展著劑「日展寶」2,000倍。	
鼠李科梨果類	疫病	1-1.5公升	800	病害發生初期開始施藥。	7					
柑桔類	疫病		800	病害發生初期開始施藥。	14	3				
柑桔類	潰瘍病	2-4.8公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				
菊	疫病		500	病害發生初期開始施藥。	14	4	每株灌藥液200公撮。			
野薑	疫病	2-5公升	500	病害發生初期開始施藥。	7					
嘉德麗雅蘭	疫病	2-5公升	500	病害發生初期開始	7				限觀賞植物使用。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
黃耆	葉部細菌性病	1-1.5 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				本項修正。
可可	果疫病	1.1-2.5 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	連續5次				

23 (%) (w/w) 三元硫酸銅 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜豆	葉部細菌性病	2 公升	500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				本項新增。原始登記廠商名稱：日佳農藥股份有限公司。