

## 「曼普歐西比」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435D 號公告修正

280 g/L (28% w/v) 曼普歐西比 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7-10	共 2 次		7		
胡瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		
木瓜	果疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		
葡萄	露菌病	0.67 公升	1,800	病害發生初期開始施藥。	7-10	共 2 次		21		
十字花科小葉菜類	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		3		本項新增。
龍鬚菜										
不結球莴苣與半結球莴苣										
茼蒿										
山茼蒿										
紅鳳菜										
白鳳菜										
芳香萬壽菊										
闊包菊										
蒜										
蔥										
韭										
落葵										
珠蔥										

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菠菜										
羅勒										
蘿蔔	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		14		本項新增。
蕪菁										
山葵										
蓮霧	疫病	0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次		14		本項新增。
番石榴										
無花果										
胡瓜	露菌病	0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	共 2 次		2		本項新增。
苦瓜										
絲瓜										
冬瓜										
南瓜										
扁蒲										
隼人瓜										
越瓜										
夏南瓜										
木鱨果										