

「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 9 月 6 日農授防字第 1111489531B 號公告修正

500 G/L (50% W/V) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線蟲	0.2 公升	4,000	於植株定植後第 3 天澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-					施用前請保持土壤濕潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				1,000 公升藥液。						
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				液。					會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
草莓	根瘤線蟲	0.46-0.72 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液1 次，每株澆灌 40 毫升，施用前保持土壤濕潤。						
香蕉	根瘤線蟲	0.45 公升	10,000	限苗期使用， 使用前須維持根圈土壤濕潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。					本項新增。原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司。	

400 G/L (40% W/V) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線 蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植 後第3天澆灌 稀釋藥液1 次，每株澆灌 40毫升，或每 公頃澆灌800 公升藥液。					施用前保持土 壤濕潤。	
甜椒	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植 後澆灌藥液 1次，每株澆 灌40毫升， 或依植株栽 培密度，每公 頃澆灌250- 1,000公升藥 液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植 後澆灌藥液 1次，每株澆 灌40毫升， 或依植株栽 培密度，每公 頃澆灌250- 1,000公升藥 液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
茄子	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植 後澆灌藥液 1次，每株澆 灌40毫升， 或依植株栽 培密度，每公 頃澆灌250- 1,000公升藥 液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
枸杞	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植 後澆灌藥液					施用前請保持 土壤濕潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。						
香瓜茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
瓜果類	根瘤線 蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌50-1,000公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
草莓	根瘤線 蟲	0.62- 0.96 公 升	3,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，施用前保持土壤濕潤。						
香蕉	根瘤線 蟲	0.6 公升	7,500	限苗期使用， 使用前須維持根圈土壤濕潤，每株澆灌2-3公升藥液。						本項新增。原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司。